



FL  
2-9-69

RS  
180  
J3S8  
1937  
v.12

Sugawara, Toshiyasu  
Honzo tsukan

E

CALL NO:

AUTHOR:

RS  
180  
J3S8  
1937  
v.12

Sugawara,


TITLE:

Honzo tsukan

EAS

VOL:







問 顧  
井上通泰先生  
山田孝雄先生  
新村 出先生

正宗敦夫

編纂  
校訂

# 本草通串

自四十六卷  
至五十一卷

合資  
會社

日本古典全集刊行會壽梓

長嶋豐太郎精刻

RS  
180  
J3S8  
1937  
v. 12



本草通串卷四十六

富山侍從兼長門守管原朝臣利保纂輯

山草

土當歸

**土**地之吐生萬物者也二象地之下地之中一物出  
形也凡土之屬皆从土它魯切**藺**田相值也从田尚  
聲都郎切**歸**女嫁也从止从婦省自聲舉韋切**婦**籀

文省

說文

土

地之吐生萬物者也二象地之下地之中一物出

形也凡土之屬皆從土臣錯曰通論詳矣嵐田相值

也從田尚聲得郎反歸女嫁也從止婦眉自聲臣錯

曰婦人謂嫁曰歸止者止于此也舉章反婦猶文從

止

說文解字通釋

烏藍檐

食

○烏大也村人呼大烏

葉烏此萊但可熟食

烏藍檐檐不動

去時腹中飢歸來肩上重肩上重行路遲日暮還蒙

方蚤炊

救荒野譜



杜當歸 生密縣山野中其莖圓而有線楞葉似山

芹萊葉而硬邊有細鋸齒刺又似蒼朮葉而大每三

葉攢生一處開黃花根似前胡根又似野胡蘿蔔根

其葉味甜 枚飢 採葉燉熱水浸成黃色換水淘

洗淨油塩調食 治病 今人遇當歸缺以此藥代

之 救荒  
本草

杜當歸 生密縣山野中其莖圓而有線楞葉似山

芹萊葉而硬邊有細鋸齒刺又似蒼朮葉而大每三

葉攢生一處開黃花根似前胡根又似野胡蘿蔔根



其葉味甜 救荒 採葉燂熱水浸成黃色換水淘  
洗淨油塩調食 治病 今人遇當歸缺以此藥代  
之救荒本草○  
農政全書

土當歸 生密縣山野中苗高一尺許莖圓而有線  
楞葉似山芹葉繁而硬邊有細鋸齒刺又似蒼朮葉  
而大每三葉攢生一處開黃色根似前胡根又似野  
胡蘿蔔根其性溫葉味苦 救飢 採苗葉燂熱水

浸作成黃色換水淘洗淨以油塩調食之治病

具見  
本草

救荒本草○  
古今醫統

土當歸集解近時江淮山中出一種土當歸長近尺

許白肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷

用充獨活解散亦或用之不可不辨氣味辛溫無毒

主治除風和血煎酒服之閃拗手足同荊芥葱白煎

湯淋洗之

時本草  
珍綱目

土他魯切從上聲五行之一○說文地之吐生物者

也二象地之下地之中物出形也或曰从二地从一

象地中物挺出形舊从一地之形从个象艸木冒地

而生篆作个形類竹非是或又曰一指地一指艸

水初生地膚隆起（象其形鐘鼎文作土，𡵓泥同文）  
舉要老子土作土，旁加點尤非。當都昌切，黨平聲。說  
文田相值也。○从田尚聲，篆作𡵓，同文。舉要篆作𡵓，  
𡵓非，借尚爲當。篆作尚，尤非。歸古威切，音規，入也。還  
也。又婦人嫁曰歸。○說文女嫁也从止从婦省，自聲。  
六書故曰：婦人內夫家故嫁曰歸，狀父母家實其所  
自出，故其來寧亦曰歸。嫁非歸之本義。按書故說近  
理。說文專訓女嫁，非或曰：籀文从止作歸，石鼓文从  
辵作歸，于義爲近。說文改从自，非是。又奇字韻歸

作歸華陽國志種歸作歸漢碑作歸隸釋作歸存備

考正

通正字

土姚次清他魯切免上聲土地稱地爲后土取厚載之義當唐清都郎切黨平聲理合如是也歸支清居

爲切音規入也還也又婦人嫁曰歸字彙

增本草綱目近時江淮山中出一種土當歸長近尺

許白肉黑皮氣芬香如白芷人亦謂之水白芷用充獨活氣味辛溫無毒除風和血煎酒服之閃拗手足

同荊芥蔥白煎湯淋洗之

廣羣芳譜



土唐韻正韻他魯切集韻韻會統五切𣎵吐上聲五

行之一說文地之吐生物者也二象地之下地之中

物出形也當古文𣎵唐韻集韻韻會正韻𣎵都郎切

黨平聲說文田相值也从田尚聲歸古文𣎵唐韻舉

韋切集韻居韋切𣎵音馳還也入也○簡省作𣎵漢

碑作歸

康熙字典

土當歸和名今按左

サワ和字登俗名左伊志多識編

ウド 日本ニ昔ヨリウドノ根ノ母ヲ獨活トシ

其根ノ長キヲ羌活トス今藥肆ニウルモノ是ナ



リ然レドモ中夏ヨリ來ルト別ナリ不可用只萊  
トスベシ初生ノ茅及莖爲蔬有香氣爲佳品三月  
ヲ過テハ硬シ不可食其根長シ是亦可食心ヲ去  
煮之乾テ爲茹最美ナリ苗モ根モ野藪ノ上品ト  
スベシウドノ實ヲ團ニウヘテヨシ長ジテ後冬  
ヨリ根上ニワラ芥ヲ深ク掩ヘバ白莖長クノ可  
食西土ノ俗ハウドヲシカト云大和  
本草  
土當歸 佐波字止 水綱土當歸根長近尺許白  
肉黑皮氣亦芬香如白芷氣人亦謂之水白芷用充

獨活解散亦或用之△按此俗云澤獨活和漢三才圖會

土當歸 葉三葉ニノ香甚シ白芷ノ一ルイ也細

葉ノ白芷カト云洛ノ坂本奇崎ナトニ産ス 集

解ノ下磨滅ス救荒第四杜當歸ノ下ヲ以補入ベ

シト云 別本ニ云土當歸水白芷也或人云シ、

ウド可充力救荒ノ杜當歸一物也本草會誌

杜當歸 葉似蒼朮葉開黃花似前胡根物品目録

杜當歸 此モノ江戸近方ニアルナリ信州ノ和

田峠邊多クアリ圖ヨク似タリ日光方言ニウコ

シ艸當歸ニカエテ藥ニナスト云今コ、ロムル

ニ □ □

救荒  
臆斷

土當歸

土救荒本草  
二社二作ル

ウド

シカ

筑前

トゼン

薩州

一名

水白芷  
集獨活  
集鮮

香白芷

本草  
原始

此ニ其形狀ヲ

載ルニ據テ考フレバ      ウドニ充ルヲ穂トスベ

シ

本草  
啓蒙

土當歸

和名ウド羌活ハナウド

藥名  
考

土當歸

サハウド

藥品手  
引草

杜當歸

和名嵯峨ウド

京嵯峨ノ嵐  
山ニ多シ

ヤブウド

京方 言 クハズウド ハナウド 増上寺白芷 武江

増上寺山中ニ 代々參坂上人 スボンチュリエ

多生ス 西湖 和 一名香白芷 本草原始

水白芷 綱目獨活集解 綱目ノ土當歸ナリ 獨活集解

時珍説トコ口香如白芷亦土當歸集解ニ氣味辛

温トアリ亦コノ説ニ薑有線楞葉有細鋸齒刺根

似野胡蘿蔔根等ノ説合セ考ルニ増上寺白芷ナ

ルベシ武州王子邊ノ山足濕地ニ多シ春宿根ヨ

リ生ズ葉ハ獨活ニ似テ葉薑ヲ拂キ淺黄綠色莖

葉共ニ毛茸多シ莖肥大ニテ堅緑稜アリ夏月高  
サ四五尺莖頭並枝梢ニ傘狀ヲナシテ花アリ野  
胡蘿蔔花ニ似テ甚肥大後實アリ形白芷ニ似テ  
鬚アリ初秋ニ苗枯ル葉根ミナ香氣アリ白芷ニ  
似タリ味辛シ根形又野胡蘿蔔根ニ似テ肥大ナ  
リ澄元云信州和田峠邊多アリ圖ニ多似タリ日  
光方言ニ　ウコンサウト云當歸ニカエテ藥ニ  
ナスト云コノ物同物歟救荒本草通解

土當歸　ハナウド　江戸芝増上寺山中ニアル



本草通串 二  
 ヌヘ増上寺白芷ト呼ブ又飛鳥山下陰濕ノ地ニ  
 多シ宿根ヨリ生ズ五月花アリ白色形獨活ニ似  
 タリ莖中空虛ニシテ毛茸多ク條理アリ臭氣多  
 シコ、ノ集解ニテハ考ベキ説ナケレドモ本草  
 原始ニ土當歸源類獨活但肉白聞之臭氣薰人賣  
 者假充獨活トイフ是也 本草  
圖譜

ウド 山ノ荒地ヲ三四尺モ掘内ヲ平ニシテ其  
 低處ヘ植付冬ノ始メヨリ塵芥ノ内ニテ水ノ枝  
 竹等ヲ拾捨細芥バカリヲ段々厚ク覆ヒ置芽出

ル時右ノ芥ヲ取ノケ根ヘサワラ又様ニ茅ヲ切  
取ベシ尤早ク茅ヲ取タル跡ヘハ又前ノゴトク

芥ヲ掛置バ又茅ヲ生ルナリ  
草木 育種

ハナウド 漢名未詳 京嵐山ニ産ス高七八尺五月  
比花アリウドノ類ニノ花美也根生干

ノ氣味薄藥店嵐山羌活ト云ウド  
羌活ニ相交テ俱ニ真物ニ非ズ  
○ドゼン 土當歸

**肥前**

○ツクリシカ 土當歸 筑前

○ウド 土當歸

本綱十三

本綱十三

日本往昔ヨリ此根新舊ヲ採ニ活ト  
ノ藥ニ用ユ甚非也培養常食ノ品也  
○ノウド 土當歸

**歸**

**本綱十三**

○シカ

土當歸 筑前

○シンサウ

土當歸 和方書

**神本草藥名備**  
**草考和訓鈔**

本草

土當歸

六

土當歸 救荒本草所載杜當歸卽是乎姑欠詳審

或云水白芷亦未詳

本草綱目纂疏

ウド 土當歸

水白  
物品  
識名

杜當歸 卽土當歸 ウド 山中自生アリ然レ

近山ニ稀ナリ今多ク出ル者ハ皆作りウドニシ

テ氣味薄シ自生ハ味苦ク氣烈ナリ春嫩芽ヲ採

リ食用トス夏月莖高サ六七尺枝端ゴトニ小白

花數十攢簇シテ傘蓋ノ如シ後實ヲ結ブ形大葉

川芎實ニ異ナラズ

救荒本草啓蒙

烏藍擔

未詳

救荒野  
譜啓蒙

土當歸

水白芷

手板  
發蒙

本草通串卷四十六

二  
上  
夏  
自  
多  
二

土當歸

九終





本草通串卷四十七

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

都管草

**都管草** 有先君之舊宗廟曰都从邑者聲周禮距國五百里爲都當孤切管如簾六孔十二月之音物開地牙故謂之管从竹官聲古滿切

說文

邑有先君之舊宗廟曰都从邑者聲周禮距國五百里爲都臣鍇曰按周禮四縣爲都丁沽反管如簾六孔十二月之音物開地牙故謂之管從竹官聲臣鍇按爾雅大管謂之簾十二月二陽生出地散故曰殷爲地正也古短反

說文解字通釋

都管草一莖六葉解蜈蚣毒廣西出之

桂海虞衡志

都管草生宜州田野根似羌活頭歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月八月采根陰乾施州生者作蔓又名香越蔓長丈餘赤色秋結紅實四時

皆有赤其根枝淋洗風毒瘡腫治風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈

圖經本草

都管草集解頌曰都管草生宜州田野根似羌活頭

歲長一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月八

月赤根陰乾施州者作蔓又名香越蔓長丈餘赤色

秋結紅實四時皆有赤其根枝淋洗風毒瘡腫主治

風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含

之立愈

蘇圖經○水  
頌草綱目

集解時珍曰按范成大桂海虞衡志云廣西出之一

莖六葉氣味

苦辛寒無毒

主治解蜈蚣蛇毒

時珍本草綱目

都模清東徒切妒平聲天子所居曰都又十邑曰都

周禮四縣爲都左傳邑有先君之廟曰都又小曰邑

大曰都管緩清古緩切官上聲樂器說文如箎六孔

十二月之音

彙字

都東孤切妒平聲天子所居曰都又十邑曰都周禮

距國五百里爲都左傳邑有先君之廟曰都又邑都

名相通管古緩切官上聲說文如箎六孔十二月之

音物閑地牙故謂之管

正字通

增圖經本草都管草生宜州田野根似羌活頭歲長

一節苗高一尺許葉似土當歸有重臺二月八月采

根陰乾施生者作蔓又名香毬蔓長丈餘赤色秋

結紅實四時皆有采其根枝淋洗風毒瘡腫桂海

虞衡志都管草一莖六葉解蜈蚣毒

廣群芳譜

都古文粍唐韻當孤切集韻韻會正韻東徒切音

聞廣韻天子所官曰都周禮地官小司徒四縣爲都

管廣韻古滿切集韻韻會正韻古緩切音管樂器

康熙  
字典



都管草 和名未詳 多識編

都管草 生田野苗高一尺許葉似土當歸有重臺

根似羌活頭歲長有節 按歲音歪和漢三歲裏不正才圖會

都管草 若水老人晚年見出サレタル由也シカ

レ氏秘ノツイニ云キカサレズト也 本草會誌

都管草 詳ナラズ ハチゼウサウニ充ル古説

ハ穂ナラズ八丈サウハ果部鹽麩子ノ附録ノ鹹

草ニ近シ 本草啓蒙

都管草 八丈草 アシタバ 往々庭院ニ栽フ葉ハ兩平草

ニ似テ花岐更ラニ多クシテ周齒アリ宿根ノモ  
ノハ莖ヲ抽ンズルコト六七尺ニ至ル葉差互シ  
テ幹ヲ抱ク葉大サ二尺餘ソノ色黄緑ナリ莖葉  
コレヲ斷テバ黄漿出ルコト博落廻ノ如シ秋ニ  
入テ莖頂ゴトニ細枝ヲ平分スルコト數十每枝  
花ヲ布クフ亦數十凡ソ數百千花結ンデ一窠ヲ  
同フス傘蓋狀ノ如シ花大サ分許五出白色亦夕  
兩平草花ニ髣髴ス實扁長ニシテ嵯峒子ニ類ス  
ミナ兩片合成ス取り扱メテ下種ス年ヲ踰テ乃

手花サク花

都管草

カラノクサ

藥品手引草

都管草

或云晨草

一名八丈草是未必確當本草綱目

纂疏

本草通串卷四十七

本草通串卷四十八

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

升麻

升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百積老物殃  
鬼辟瘟疫瘴氣邪氣壅毒入口皆吐出中惡腹痛時  
氣毒癘頭寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕身

長年

神農本草經○  
大觀本草

本草經曰升麻味甘辛治辟百毒殺百精老物殃鬼

辟溫疫瘴邪毒蠱久服不夭

神農本草經○  
太平御覽

升麻

本品

氣味

甘味苦平微寒無毒

主治

解百毒殺

百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出

中惡腹痛時氣毒痢頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

久服不夭輕身長年

神農本草經○  
本草綱目

本草云主解百毒殺百精老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪

氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時氣毒痢頭痛寒熱



風腫諸毒喉痛口瘡

神農本草經  
湯液本草

升麻味甘苦辛微寒無毒主解百毒殺百精老物殃

鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時

氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡

神農本草經  
疏○吳懷祖

輯要

升麻生益州山谷二月八月採根日乾

名醫別錄○  
大觀本草

集解別錄曰升麻生益州山谷二月八月采根日乾

名醫別錄○  
本草綱目

仲景云太陽病若發汗若利小便重亡津液胃中乾

燥因轉屬陽明其害不可勝言又云太陽兀兀無汗者葛根湯發之若兀兀自汗者表虛也不宜用此

張仲

景○湯液本草

吳普本草云升麻一名周升麻

吳普本草綱目

吳氏本草曰升麻神農甘

吳普本草○太平御覽

廣雅云周麻升麻也

廣雅

釋名周麻時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖

廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻則周指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文卽

脫誤也

廣雅及吳普本草○本草綱目

陶隱居云舊出寧州者第一形細而黑極堅實頗無復有今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部間亦有形又虛大黃色建平間亦有形大味薄不堪用人言是落新婦根不必爾其形自相似氣色非也落新婦亦解毒取葉搗作小兒浴湯主驚悸

神農本草陶弘景註○大觀本草

**集解**弘景曰舊出寧州者第一形細而黑極堅實今惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北郡

亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用  
人言是落新婦根不然也其形相似氣色非也落新  
婦亦解毒取葉按作小兒浴湯主驚忤  
神農本草陶  
弘景註○本  
目草綱

雷公曰拆得了刀刮上麓皮一重了用黃精自然汁  
浸一宿出暴乾細剉蒸了暴乾用之  
炮炙論○  
大觀本草

根修治數曰采得刮去粗皮用黃精自然汁浸一宿

暴乾剉熬再暴用  
炮炙論○  
本草綱目

藥性論云蜀升麻主治小兒風驚癇時氣熱壅閉不

通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿沾拭瘡上主百

邪鬼魅

藥性論  
大觀本草

主治小兒驚癇熱壅不通療癰腫豌豆瘡水煎綿沾

拭瘡上

甄藥性論  
權本草綱目

升麻味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精老物殃

鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口皆吐出中惡腹痛時

氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡久服不夭輕

身長年一名周麻生益州山谷二月八月採根日乾

千金翼方



陳藏器云陶云人言升麻是落新婦根非也相似耳  
解毒取葉作小兒浴湯主驚按今人多呼小升麻惟  
落新婦功用同於升麻亦大小有殊

本草拾遺  
大觀本草

**集解**藏器曰落新婦今人多呼爲小升麻功用同於

升麻亦大小有殊也

本草拾遺  
本草綱目

之母布利

味淡

久不香六月開黃花

乎七八月結

實切肉

乎種

尔採日

尔晒或實

乃青皮

母日

尔乾而

可用

字大同類  
聚方

升麻

烏足草又云周麻

新撰  
字鏡

升麻

一名周麻

鷄骨升麻

青綠色者

落新婦

不必

和名止利乃阿之久佐

一名字多加久佐

水草和名

臣禹錫等謹按藥性論云蜀升麻主治小兒風驚癇

時氣熱壅閉不通口瘡煩悶療癰腫豌豆瘡水煎綿

沾拭瘡上主百邪鬼魅

蜀本草掌禹錫按大觀本草

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黄湯乃陽

明經藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味相

遠不同何以代之蓋以升麻止血是引地黃及餘藥

同入陽明耳

朱肱活人書

大和國升麻八斤○伊賀國升麻八斤○伊勢國升  
麻卅九斤○尾張國升麻十斤○甲斐國升麻十斤  
○越前國升麻六斤○丹波國升麻十斤○丹後國  
升麻二斤八兩○伯耆國升麻九斤○備後國升麻  
一斤○紀伊國升麻十兩○阿波國升麻十兩○讚  
岐國升麻廿斤○伊豫國升麻七斤○土佐國升麻  
四斤延喜式

升麻 本草云升麻和名止里乃阿之久佐一云宇

太加久佐和名類聚抄

別本注云今嵩高出者色青功用不如蜀者

開寶新詳定本

草○大觀本草

集解志曰升麻今嵩高者色青功用不如蜀者

開寶詳定

本草○本草綱目

日華子云安魂定魄并鬼附帝泣遊風腫毒口氣瘡

蠶又名落新婦

日華本草大觀本草

主治安魂定魄鬼附啼泣疳蠱遊風腫毒

大日華子明太明

本草綱目

圖經曰升麻生益州川谷今蜀漢陝西淮南州郡皆

有之以蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉  
並青色四月五月著花似栗穗白色六月以後結實  
黑色根紫如蒿根多鬚二月八月採日暴乾今醫家  
以治咽喉腫痛口舌生瘡解傷寒頭痛凡腫毒之屬  
殊效細剉一兩水一升煎鍊取濃汁服之入口卽吐  
出毒氣蜀人多用之揚炎南行方療煙疽湯用升麻  
又有升麻膏升麻搯湯并療諸丹毒等石泉公王方  
慶嶺南方服乳石補壅法云南方養生治病無過丹  
砂其方用升麻末三兩研鍊了光明砂一兩二物相



合蜜丸如梧子每日食後服三丸又有七物升麻丸  
升麻犀角黃芩朴硝梔子大黃各二兩豉二升微熬  
同搗散蜜丸覺四肢大熱大便秘即服三十九丸取微  
利爲知若四肢小熱於食上服二十丸非但辟瘴兼  
甚明目

圖經○大  
觀本草

集解頌曰今蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者  
爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四月五  
月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根  
紫黑色多鬚

蘇頌圖經○  
本草綱目

二

三

三

升麻

七

漢州升麻 茂州升麻 潯州升麻 秦州升麻

二月八月備急本  
採根暴乾草圖按

范石湖文集云李燾爲雷州推官鞠獄得治蠱方毒

在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之

不吐則下此方活人甚多也

范石湖文集

升麻曰周麻曰落新婦

昆蟲草木畧

廣雅曰周升麻升麻也 本草經曰升麻一名周升

麻

味甘

辛生山谷治辟百毒殺百精老物殃鬼辟溫疫

瘴邪毒蠱久服不夭生益州 華陽國志曰收麻縣

出好升麻

吳氏本草曰升麻神農甘

太平御覽

升麻味苦平性微寒無毒升也陰中之陽也其用有

四引葱白薑手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒

痛引諸藥升陽氣於至陰之下因名之曰升麻升麻

味苦平微寒無毒能解一切毒除濕去風爲傷寒時

氣之要也

升麻消風熱腫毒發散瘡癰

李杲藥性賦

象云能解肌肉間熱此手足陽明經傷風之的藥也

去黑皮并腐爛者用若補脾胃非此爲引用不能補

若得葱白白芷之類亦能走手足陽明太陰心云發

散本經風邪元氣不足者用此於陰中升陽氣上行  
東垣云升麻入足陽明若初病大陽證便服升麻葛  
根發出陽明經汗或失之過陽明經燥太陽經不可  
解必傳陽明矣投湯不當非徒無益而又害之也  
李東垣○湯液本草

氣味 景曰引蔥白散手陽明風邪引石膏止陽明齒  
痛人參黃芪非此引之不能上行發明 景曰升麻發  
散陽明風邪升胃中清氣又引甘溫之藥上升以補  
衛氣之散而實其表故元氣不足者用此於陰中升

陽又絡帶脈之縮急此胃虛傷冷鬱遏陽氣於脾土

者宜升麻葛根以升散其火鬱

李杲○本草綱目

珍云脾痺非此不能除訣云主肺痿咳唾膿血能發

浮汗

張元素珍珠囊  
○湯液本草

氣味

元素曰性溫味辛微苦氣味俱薄浮而升陽也

爲足陽明大陰引經的藥得葱白白芷亦入手陽明

太陰主治治陽明頭痛補脾胃去皮膚風邪解肌肉

間風熱療肺痿欬唾膿血能發浮汗

元素

發明元素曰

補脾胃藥非此爲引用不能取效脾痺非此不能除



其用有四手足陽明引經一也升陽氣於至陰之下  
二也去至高之上及皮膚風邪三也治陽明頭痛四

也張元素○  
本草綱目

朱氏云瘀血入裏若衄血吐血者犀角地黄湯乃陽  
明經聖藥也如無犀角以升麻代之升麻犀角性味  
相遠不同何以代之蓋以升麻止血是引地黃及餘  
藥同入陽明耳朱肱活人書  
○湯液本草

升麻 氣平味苦甘微苦微寒味薄氣厚陽中之陰  
也無毒陽明經本經藥亦走手陽明經太陰經湯液  
本草

主治 牙根浮爛惡臭太陽熱衄爲瘡家聖藥好發明

好古曰升麻葛根湯乃陽明發散藥若初病太陽證便服之發動其汗必傳陽明反成其害也朱肱活人書言瘀血入裏吐血衄血者犀角地黄湯乃陽明經聖藥如無犀角以升麻代之二物性味相遠何以代之蓋以升麻能引地黃及餘藥同入陽明也○王好古本草綱目

既濟公升輟耕錄

升麻 味苦甘氣平微寒氣味俱薄浮而升陽也無

毒雖多陝地惟尚益州屬四川今改成都府入藥宜根逢秋終

抹曝乾形輕實者第一削出青綠色者亦佳擇雞骨

相同去黑皮腐爛乃足陽明太陰行經之藥凡補脾

胃必此引之若得白芷葱白同煎又走手經陽明太

陰非此四經不可用也解百毒殺百精殃鬼釋諸瘡

辟諸疫瘟邪去傷風於皮膚散發熱於肌肉儻太陽

證具誤服是先引賊寇破家

東垣云初病太陽証便服升麻葛根湯是遺太

陽不惟遺經反引太陽邪氣入于務認分明切勿鹵

莽止頭痛喉痛齒痛併中惡腹痛理口瘡疥瘡斑瘡

及疏痘爛瘡治風腫風癰療肺癰肺痿故聖藥爲瘡  
家之號的藥來風家之稱升提元陽不下陷陰分挾  
引諸藥同行達四經東垣云引葱白散手陽明風邪  
引石膏止足陽明齒痛是也梢子收取堪治脾痺久  
服不夭輕身益壽護按仲景傷寒論云瘀血入裏若  
衄血吐血者犀角地黄湯主之夫犀角乃陽明聖藥  
也又曰如無犀角代以升麻其犀角升麻氣味大相  
遠隔何以代云不過知升麻亦陽明經藥用之以引  
地黃及諸藥同入陽明經爾舍此他用豈復能乎本草

蒙筌

升麻味甘苦性微寒無毒入大陽脾胃肺四經引蔥  
白散手陽明之風邪引石膏止足陽明之齒痛引諸  
藥遊行四經升陽氣於至陰之下故名升麻又主解  
百毒殺精物辟瘟疫除蟲毒止瀉痢白芷爲使形輕  
而堅實青綠色者佳 按升麻提氣解肌故入此四  
經然奉令之使不能益人若下元不足者用此升之  
則下虛而元氣益虧矣藥性乃曰元氣不足者用此  
於陰中升陽恐非惟陽氣有餘而下陷者宜之若初



病太陽症便服升麻以發陽則汗是引賊入門亦非所宜也 雷公云抹得後用刀刮上麓皮一重了用黃精自然汁浸一宿漉出曝乾細劉蒸了曝鑄補雷公炮乾用之佳製藥性解

釋名周麻時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名周升麻則周或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文卽脫誤也根修治時珍曰今人惟取裏白外黑而緊實者謂之鬼臉升麻去鬚及蘆劉用氣味時珍曰升麻同柴胡引生發之氣上行同葛根能發陽明之汗

主治時珍曰消斑疹行瘀血治陽陷眩運胃脇虛痛

久泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰痿足寒

時珍發明時珍曰升麻引陽明清氣上行柴胡引少陽

清氣上行此乃稟賦素弱元氣虛餘及勞役饑飽生

冷內傷脾胃引經最要藥也升麻葛根湯乃發散陽

明風寒藥也時珍用治陽氣鬱遏及元氣下陷諸病

時行赤眼每有殊效神而明之方可執泥乎一人素

飲酒因寒月哭母受冷遂病寒中食無薑蒜不能一

啜至夏酷暑又多飲水兼懷怫鬱因病右腰一點服

痛牽引右脇上至胸口則必欲卧發則大便裏急後  
重頻欲登圜小便長而數或吞酸或吐水或作瀉或  
陽痿或厥逆或得酒少止或得熱稍止但受寒食寒  
或勞役或入房或怒或饑卽時舉發一止則諸證泯  
然如無病人甚則日發數次服溫脾勝濕滋補消導  
諸藥皆微止隨發時珍思之此乃飢飽勞逸內傷元  
氣清陽陷遏不能上升所致也遂用升麻葛根湯合  
四君子湯加柴胡蒼朮黃芪煎服服後仍飲酒一二  
盃助之其藥入腹則覺清氣上行胸膈爽快手足和

煖頭目精明神未迅發諸證如掃每發一服卽止神  
驗無比若減升麻葛根或不飲酒則效便遲大抵人  
年五十以後其氣消者多長者少降者多升者少秋  
冬之令多而春夏之令少若稟受弱而有前諸證者  
並宜此藥治法治之素問云陰精所奉其人壽陽精  
所降其人大千古之下窺其奧而聞其微者張潔古  
李東垣二人而已外此則著參同契悟真篇者皆與  
此同也又升麻能解痘毒惟初發熱時可用解毒痘  
已出後氣弱或泄瀉者亦可少用其升麻葛根湯則



見斑後必不可用爲其解散也本草以升麻爲解毒吐蠱毒要藥蓋以其爲陽明本經藥而性又上升故也按范石湖文集云李燾爲雷州推官鞠獄得治蠱方毒在上用升麻吐之在腹用鬱金下之或合二物服之不吐則下此方活人甚多也

本草綱目

升麻味苦微辛氣寒氣味俱薄浮而升陽也爲足陽明太陰引經之藥

蘇氏曰升麻生蜀漢陝西淮南以郡以川蜀者爲勝春生苗高三尺

葉似麻莖青色四五月開花似粟穗白色六月結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚陶弘景曰舊出寧州者殊勝形細而黑極堅實今出益州者細小而堅削去皮青綠色謂之雞骨升麻亦佳北郡建平一種虛大

升麻

二十四



黃白色味薄嵩高一種純青色質亦堅又一種外黑裏白質亦緊實謂之鬼臉升麻並不堪用俱不如川蜀青綠色者爲最也又一種落新婦根其形相似氣與色俱非力同升麻用于兒科解毒瘡癰方中稍可餘不然也用者不可不○升麻散表升陽之劑也療辦修事去皮暴乾用

傷寒解陽明在表發熱頭額痛眼眶之邪辟瘟疫吐痛鼻乾不得眠

蠱毒惡厲之氣發痘瘡于隱密之時化癰毒于延綿之際但味苦寒平稟天地極清之體故能効升散之用所以風寒之邪發熱無汗風熱之邪頭風攻痛并目疾腫赤乳蛾喉脹升麻並皆治之又如內傷元氣脾胃衰敗下陷至陰之分或醉飽房勞有損陽氣致

陷至陰之中或久病瀉痢陽氣下陷後重窘迫或久  
病崩中陰絡受傷淋瀝不止或胎婦轉胞下墜小水  
不通或男子濕熱下注腰膝沉重或瘡毒內陷紫黑  
脹痛或大腸氣虛肛墜不收升麻悉能療之此升解  
之藥故風可散寒可驅熱可清瘡疹可解下陷可舉  
內伏可托諸毒可拔又諸藥不能上升者惟升麻可  
以升之觀其與石膏甘草治齒痛與人參黃耆補上  
焦不足與桔梗欬冬治肺癰膿血意可見矣但屬陽  
性升凡吐血衄血咳嗽氣急陰虛火動及氣逆嘔吐

怔忡癲狂等證一切禁用 沈起愚先生曰升麻稟

天地清陽之氣以生故能升陽于至陰之下顯明滅

暗致新推陳升麻兩得之矣 廬子由先生曰升卽

四氣之先機時令之首兆也經云春三月此謂發陳

者是矣設無成功之藏之入亦無將來之生之升矣

所謂柔以時升積小以高大實非決驟之比

本草  
最言

升麻蜀川者勝葉似麻葉根入藥升提元陽不下陷

陰故名升麻

味甘苦平微寒無毒主解百毒殺百精  
老物殃鬼辟瘟疫瘴氣邪氣蠱毒入口

特吐出中惡腹痛時氣毒癘頭痛寒熱風腫諸毒喉  
痛口瘡久服不夭輕身長年○川升麻形小而黑極

堅實凡用惟川爲勝形大肉雷公曰採得後用刀刮黃色味薄細去皮青綠色佳上麋皮一重了

用黃精自然汁浸一宿漉出曝乾細判蒸了曝乾用之佳本草原始

升麻味苦甘氣平微寒浮而升陽也無毒入足陽明大陰之經能升脾胃之氣得白芷葱白同用又入手陽明大陰二經其餘他經皆不能入能辟疫氣散肌膚之邪熱止頭齒咽喉諸痛併治中惡化斑點瘡疹實建奇功療肺癰有效但必須同氣血藥共用可佐使而又不可以爲君藥世人慮其散氣不敢多用是也然而又有宜多用之時本草如綱目經疏尚未及



言況他書乎夫升麻之可多用者發斑之症也凡熱不太甚必不發斑惟其內熱之甚故發出于外而皮毛堅固不能遽出故見斑而不能驟散也升麻原非退斑之藥欲退斑必須解其內熱解熱之藥要不能外元參麥冬與苓連梔子之類然元參麥冬與苓連梔子能下行而不能外走必藉升麻以引諸藥出于皮毛而斑乃盡消倘升麻少用不能引之出外勢必熱走于內而盡趨于大小腸矣夫火性炎上引其上升者易於散任其下行者難於解此所以必須多用



而火熱之毒隨元參麥冬與芩連梔子之類而行盡  
消化也大約元參麥冬用主一二兩者升麻可多用  
至五錢少則四錢斷不可止用數分與一錢已也○  
或問升麻能止衄血先生置而不講豈仲景張夫子  
非歟曰以升麻爲止血之藥此不知仲景夫子用升  
麻之故也夫吐血出于胃衄血出于肺止血必須地  
黃非升麻可止用升麻可止用升麻者不過用其引  
地黃入于肺與胃耳此等病升麻又忌多用小用數  
分便能相濟以成功切不可多至于一錢之外也○

又問升麻升而不降何以大便閉結反用升提必取  
于升麻豈柴胡不可代耶曰升麻與柴胡同是升提  
之藥然一提氣而一提血大便燥急大腸經之火也  
大腸有火又出于腎水之潤也欲潤大腸舍神血之  
藥由血而補血又責之補腎使腎之氣通于大腸而  
結閉之症可解然則通腎之氣以生血可也而必加  
升麻于補腎補血之中者蓋陰之性凝滯而不善流  
動取升麻而升提其陰氣則肺金清肅之令行況大  
腸與肺又爲表裏肺氣通而大腸之氣又通肺氣通

而腎之氣更通所以閉者不閉而結者不結也若用  
柴胡雖又入肝能提血分之氣終不能入于大腸通  
于肺腎之氣此柴胡之所以不可代升麻也○或問  
升麻與犀角迥殊何以古人有無犀角用升麻代之  
語以升麻犀角同屬陽明也然否夫升麻雖與犀角  
同屬陽明而仲景夫子用升麻以代犀角非特爲其  
同屬陽明也犀角地黃湯所以治肺經之火也犀角  
引地黃以至于肺而升麻又能引地黃以至于肺也  
肺與大腸爲表裏清肺而太陽陽明之火自降瘀血

必從大便而出是升麻清肺正所以清陽明也○或

問升麻用之于補中益氣湯中豈慮柴胡不能升舉

故用之以相佐耶曰柴胡升麻同用之補中益氣湯

者各升提其氣又兩相顧而兩相益也柴胡從左而

升氣升麻從右而提氣古人已言之矣然而柴胡左

升氣而右未嘗不同提其氣升麻右提氣而左又未

嘗不共升其氣又兩相顧而兩相益也

本草新編

升麻

仁厚仁引是乾性平

一云微寒

味甘苦無毒

主解百毒殺百積老物辟瘟疫瘴氣療蠱毒治風腫

諸毒喉痛口瘡本草○生山野中其葉如麻故名爲升

麻二月八月採根暴乾刮去黑皮並腐爛者用細削

如雞骨色青綠者佳本治手足陽明風邪兼治手足

太陰肌肉間熱入門○陽明本經藥也亦走手陽明

太陰經若元氣不足者用此於陰中升陽氣上行不

可缺也丹心○陽氣下陷者宜用若發散生用補中

酒炒止汗蜜炒入門東醫寶鑑

升麻 周升麻 周麻 既濟公事物異名

收靡縣味縣皆屬益州○李奇曰靡音麻升麻所出



孟康曰味音昧通雅

升麻 甘辛微苦足陽明太陰引經藥胃脾參耆上行須此引之

亦入手陽明太陰肺表散風邪引蔥白散手陽明風邪同葛根能發

陽明之汗引石膏止陽明頭痛齒痛升發火鬱能升陽氣于至陰之下

引甘溫之藥上行以補衛氣之散而實其表柴胡引少陽清

氣上行升麻引陽明清氣上行故補中湯用為佐治使若下元虛者用此升之則下元愈虛又當慎用

時氣毒癘頭痛陽明頭痛連齒頰寒熱吐膿下痢後重後重者氣

滯也氣滯于裏必上行而後能下降有病大小便秘者用通利藥而罔効重加升麻而反通丹溪曰氣升

則水自降經曰地氣上為雲天氣久泄經曰清氣在下為雨天地不交則萬物不通也下則生痰泄

脫肛崩中帶下能緩帶脉足寒陰痿目赤口瘡痘瘡

升葛湯初發熱時可用痘出後氣弱或泄瀉者斑疹

可少用否則見斑之後必不可用為其解散也斑疹

成孕如錦紋者為斑隱隱見紅點者為疹益胃熱失

下銜入少陽則助相火而成斑銜入少陰則助君火

而成風熱瘡癬解百藥毒吐蠱毒殺精鬼性陽氣升

陰虛火動者忌用朱肱活人書言痰血入裏吐衄血

犀角代以升麻二藥性味相遠何以為代蓋以升麻

能引諸藥同入陽明也朱二允曰升麻性升犀角性

降用犀角止血乃借其下降之氣清心肝之火使血

下行歸經耳倘誤用升麻血隨氣升不愈湧出不止

乎古方未裏白外黑緊實者良名曰鬼臉升麻去

可盡泥也

鬚蘆用或有參耆補劑須用升柴而又恐其太升發

者升麻柴胡並用蜜水炒之別有一種綠升

本草綱目卷之二十四  
麻繆仲醇用治增訂本  
滯下每每有驗草備要

升麻東天地清陽之氣氣味俱薄浮而升陽也爲脾胃引經的藥升陽氣於至陰之下東垣曰引蔥白散手陽明風邪引石膏止陽明齒痛人參黃耆非此引之不能上行也得蔥白白芷緩帶脈之縱急同葛根連翹元參甘草生地麥冬治牙根浮爛惡臭同射干水煎服治射工溪毒并以滓塗之性主升發凡小兒斑痧痘瘡未見點時可用見標之後不可用並吐血鼻衄咳嗽多痰陰虛火動腎經不足及氣

逆嘔吐驚悸怔忡癲狂等病法咸忌之誤用多致危

殆

本草經疏輯要

周麻 本草綱目升麻一名周升麻則周或指周地

如今人呼川升麻之義今別錄作周麻 既濟公

清異錄候寧極藥既濟公升麻也

事物異名錄

升清清次式合切音聲

漢書升者登合之量也

彙

升審征切音聲十合器也漢律歷志升者登合之量

也龠十爲合合十爲升升十爲斗

正字通

升唐韻識蒸切

集韻韻會

書蒸切竝音陞

說文篇也



十合爲升

康熙字典

增本草綱目

升麻一名周麻

李時珍曰其葉似麻其性上升故名按張揖廣

雅吳普本草并云升麻一名周升麻則或指周地如今人呼川升麻之義今別錄作周麻非省文卽脫誤也

陶弘景曰舊出寧州者第一形細而黑極堅實今

惟出益州好者細削皮青綠色謂之雞骨升麻北部亦有而形虛大黃色建平亦有而形大味薄不堪用

蘇頌曰蜀漢陝西淮南州郡皆有之以蜀川者爲勝春生苗高三尺以來葉似麻葉並青色四五月著花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色



多發氣味甘苦平微寒無毒解百毒辟瘟疫療癘邪  
鬼蠱毒治陽明頭痛補脾胃去風邪療癰腫能發浮  
汗消斑疹行瘀血彙考增前漢書地理志益州郡縣  
有牧靡註李奇曰靡音麻卽升麻殺毒藥所出也

**博物志**牧靡草可以解毒鳥多誤食中毒必急飛往

牧靡山啄牡靡草以解之

**水經注**涂水出建寧郡

之牡靡縣南山縣山並卽草以立名山在縣東北焉  
句山南五百里山生牡靡可以解毒百世方盛

別

**錄增**炮炙論永得刮去麤皮用黃精自然汁浸一宿

暴乾剉蒸再暴用

本草綱目 今人惟取裏白外黑

而緊實者謂之鬼臉升麻去鬚及頭蘆剉用

廣群芳譜

藥品

升麻 其葉如麻其性上升故名升麻通鑑輔志

升麻

和名

土利トリ乃安志久左ノアシクサ又稱字多加久左ウタカクサ

增

補異名

周麻

多識編

升麻

和名

度利トリ乃阿志久佐ノアシクサ

ウタカタ草

○

下野シモツケ

○シモツケヤマカキニマシルアケサ井ノヨヒラニミレハヤ、コソハサケ○イマノ

ヲニオモヘルワレヲ山チサノ花トハ君カウツ口ヒスラン○イカハカリ人ノアフラシカクラ

クノハツ勢ニマケル山チサノ花○年クル、ツマ水ニマシル山チサノタ、一枝ハウナヒコノ

タノ○シラ雲ノハレセ又山ノ山チ露カケテサ  
サノ花サケル色コレ見ハヤサン

ク 露ヲオモミナド、ヨメリ

藻鹽草

升麻 氣味甘 苦平一云微寒一云辛微苦温 異名周

麻 裏白 夕外黒ノ實ノ堅者ヲ鬼臉升麻ト名ク

和名 堯里迺阿志久佐 禹佗可俱佐 修治 二八月

ニ根ヲトリ 米泔シロミツニ浸シ土氣ヲ洗ヒ黒皮ト鬚ト

朽タル所ヲ去リ剉ミ用ユ火ヲ忌ム 能足ノ陽明

胃 大陰 脾ノ引經ノ藥ニノ葱白白芷ヲ得テ手ノ

陽明 大腸 大陰 肺經ニ入テ風邪ヲ去ル石膏ヲ引

ニ直 通 三 二 升麻

三十三

テ陽明胃ノ經ノ齒痛ヲ治ス○參芪ハ升麻柴胡  
ニ非レバ清氣ヲ上ニ引コト叶ハズ中氣脾胃虛  
ノ者補中益氣湯ニ升麻ハ右ヨリ柴胡ハ左ヨリ  
生發ノ清氣ヲ引上テ上ニ行ラス○升麻ノ功四  
アリ一ニハ手足陽明ノ引經ニハ陽氣ヲ至陰ノ下  
ヨリ升ス三ニハ頭ヨリ手足皮膚ニデノ風邪ヲ去  
ル四ニハ陽明ノ頭痛ヲ治ス○葛根ニ與メ陽明ノ  
風熱ヲ治シ汗ヲ發ス又冷物ノ食ニ傷ラレ脾胃  
虛ノ陽氣鬱遏スル者升麻葛根ヲ以テソノ火鬱

ヲ升散ス○或人酒ヲ嗜ミタルガ寒氣ニ中ラレ  
憂ニアヒ夏ノ時ニ水ヲ飲火鬱ノ右ノ腰張痛ミ  
脇へ拘攣胸口マデ響引<sup>ヒキ</sup>大便利急後重小便數ク  
吞酸吐水厥逆ス酒ヲ飲テ少シ止又夏ハ緩ク寒  
氣ヲ病ニ或ハ饑或ハ勞又ハ怒ナドスレバ其マ  
テ發ル起リ止バ無病ナル人ノ如シサテ温補  
ノ益ナシ止リテモ跡ヨリ起ル是飢飽勞逸ニ  
元氣ヲ傷リ清陽下陷ノ升ザル故也四君子湯ニ  
升麻葛根湯ヲ合メ柴胡蒼朮黃芪ヲ加テ煎服シ



時々酒ヲ飲デ藥力ヲ助ク清氣ノ下ヨリ升ルヲ  
覺テ胸サハヤカニ手足ヤワラカニ頭目清ク諸  
症イエタリ人ミナ五十歳ノ比ヨリハ陽氣消易  
ク下陷スルモノ多シ素問ニ陰精所奉其<sub>ス</sub>人壽陽  
精所降其<sub>ス</sub>人夭トイヘル怯弱ノ人前症アラバ必  
ズ此方ヲ用テ奇効ヲ著スコノ証多クノ知力タ  
キ故ニ書シルスナリ○瘀血裏ニ入り吐血衄血  
スル者犀角地黄湯ヲ用ユ犀角ナキ時ハ升麻ヲ  
用テ代藥トス犀角ト升麻ト性モ味モ別ナリ然

ヲ代藥トスル事ハ升麻ヨク地黄等ノ餘藥ヲ引  
テ陽明ニ入故也痘疹ノ餘毒及ビ赤眼瘡癰丹毒  
邪熱内ニツ、ミタルニ犀角消毒飲ヲ用エルモ  
犀角ナケレバ升麻ヲ用ユ藥功スデニ升麻ヨリ  
イダサシム毒脱肛ニ忌ム○冷証ニ忌ム○脈沉  
細ニノ自汗スルニ忌ム只浮大數ニノ熱狂スル  
ニ用ユベシ

藥性  
能毒

升麻甘辛苦平微寒形細而黑極堅實剝去皮青綠  
色者謂之雞骨升麻外黑裏白而緊實者謂之鬼臉

升麻去鬚及頭蘆用 △今人以春<sup>アキ</sup>雪花或海根<sup>ミツキ</sup>根

爲升麻者非是<sup>本草</sup>  
<sup>候</sup>襟

升麻 若水云葉強クシテ筍根<sup>ウツキ</sup>空水ニ似タリ又

苧葉ニ似テ葉大ナリ葉皆向上一根叢生ス又有<sup>ニ</sup>

別ニ能似者勿誤混<sup>年</sup>水草曰生苗高三尺以來四五

月著花似粟穗六月以後結實黑色中華ヨリ來ル

外黒ク内青色ナルヲ用ユベシ時珍云今人惟取

裏白外黒而緊實者○本邦ノ俗醫升麻ト稱ノ用<sup>ル</sup>

物二種アリ一種ハ爲ノ足ト云其葉方ニ似タリ

一種ハタデ升麻ト云葉毛莖毛犬ダテニ似タリ

二種共ニ升麻ニ非ズ必<sub>レ</sub>不可<sub>レ</sub>用○今案本草無<sub>二</sub>忌

火之說入門曰發散生用補中酒炒止咳汗者蜜炒

國俗以爲忌火者何也○和名草下毛シモヅ 水ニ毛下

毛アリ花ハ相似タリ初夏發細紅花ハナ一朶群開ハナ如

敗醬 和名アハモリ 葉似芳ハナ四五月開白花ハナ如

穂大和  
本草

升麻 周麻 和名止里乃阿之久佐 一云宇多

加久佐 本綱升麻春生苗高三尺以來葉似麻葉

並青色四五月着花似粟穗白色六月以後結實黑色根如蒿根紫黑色多鬚今人取裏白外黑而緊實

者謂鬼臉升麻蓋其葉似麻其性上升故名升麻氣

味甘苦微寒浮升陽也爲足陽明引經的藥得葱

白白芷亦入手陽明太陰引石膏止陽明齒痛人參

黃芪非此引之不能上行得柴胡引生發之氣上行

得葛根能發陽明汗升麻葛根湯乃陽明發散藥

其汗必傳邪於陽若初病太陽證便服之發動明反成其害也其用有四手足陽明引經也一升陽

氣於至陰之下二也去至高之上及皮膚風邪三也治陽



明頭痛也

四

△升麻和漢同而甘有微

但葉似榆而長

有微毛爲異耳河列金剛山者良備中平福豊前中

津之産次之繡線菊

俗云之毛豆介

按繡線菊

高一二尺葉似蒲萄葉而小五月開碎花狀似胡蘿

蔔而淡赤色可愛又有白花者

〔一種〕樹有繡線菊

其樹葉似粉團花<sup>ラブリ</sup>而枝頂上開花狀似繡線菊故俗

呼曰水繡線菊

未知其和漢三  
本名才圖會

升麻 葉ニキレアリテ青クウスシロク毛ハヘ

テ花ハウスムラサキ藤色ナリ夏ノ比ヒラキ餘

花マレナレ時節ニサキテナガメ有又一種葉モ  
 花モ少ナガヒテイ口白花ナル有六月花サクナ  
 ガメアリウス紫ナルハ山野ニ多ク生ズ白花ナ  
 ルハ藥種セウメトイフ兩種氏ニ藥ニ用ルトイ  
 フ○淡盛 白シ○升麻 アハモリノゴトクニ  
 テフダイロナリ○藥種升麻 ウスムラサキ  
 セヒクシ○夏雪 花モ葉モ下野ニメギレヤス  
 シ下野草ヨリ色アカミ有リ今世間ニテ初雪ト  
 イヒ夏雪トイヒテ分明ナラズ花色赤紫ナレバ

初雪トハイハレズ然任花形ハ雪ナダレノゴト  
シ按ニ堀河院御宇カ長治二年六月二日北國ニ  
紅雪ニギフルフカサ五寸ト年代記ニ見ヘタリ其節  
此花サカリニメ雪キヘチアトニ然ルヲ人見ア  
ヤマリテ夏雪トイヒタルカ○ウヌエキ夏花モ  
葉モ夏エキ草ノゴトクニテ花ノ色サクライロ  
ナリ夏エキハ花ベニムラサキ色ナリ花形ハ夏  
雪草ト同斷○初雪草夏花モ葉モアハモリニ  
似テ花白ク花形ハヨコヘチトミダレテ大リン

アハモリハ花形ホソナガク杉ナリ也

廣益地  
錦鈔

升麻

釋名

時珍曰其葉似麻其性上升故名

修治

堅

實而綠色者佳米泔浸洗土氣去黑皮及鬚朽處剉

用忌火

氣味

甘苦平無毒

能

入肺脾胃大腸四經解

百毒殺精鬼辟瘟瘴蠱毒中惡腹痛頭痛齒痛口瘡

斑疹散陽明風邪升胃中清氣治久泄下痢遺溺帶

下陰痿足寒毒

凡氣逆嘔吐者切禁之脉沈細自汗

者及冷症者勿輕投也

修治

唐ヲ用ユベシ和不可

用アハモリ升麻水引升麻ナド、テ四五種アレ

氏皆升麻ニアラス偽物ナリ近代水フデ草或ハ  
栗穗トモ云此レ真ノ升麻ナレ氏未ダ賣買ニ出  
ズ興齋云近年和産真物藥舗ニ出ツ則チアハホ  
根ナリ姦商火ニテクスベ漢渡ニ交テ賣ヲアリ  
能本書ノ如シ少陽陽明ノ散火熱スルユヘ治  
痛口瘡葛根ト同用スレバ陽明經ノ風邪ヲ發散  
ス柴胡ト同用スレバ升提胃中清氣亦胃虛食冷  
物脾土ノ陽氣ヲ鬱遏スルニハ升麻葛根ト同用  
メ火鬱ヲ散ズ陽明經ノ本藥ナリ毒本書ノ如シ



上盛下虛ノ吐血衄血咳嗽多痰陰虛火動氣逆嘔吐怔忡癡狂等ノ証皆禁用之片五六  
八本草

升麻 **試効** 療時行邪氣瘟疫瘧氣寒熱風腫赤眼痘

瘡發越解毒麻疹喉痛口瘡消斑疹諸惡瘡癰疽久泄胃泄崩漏下血諸失血家久痢疫痢 **撰修** 凡撰升

麻以近年所出坊間呼日光升麻肥大堅實青綠色

味苦者爲佳近道諸山盡有形狀色味皆同唯較小

於日光山產者耳此乃陶弘景所謂雞骨升麻李時

珍所謂鬼臉升麻也卽花戸呼爲密慈ツ 埋又稱粟

穗草者是已可以爲其次矣唯人多不知故采用稀  
也又海船所載來藥鋪呼カラ、ワキ、アラ、デ華產青樣升麻者焦瘦輕  
虛陳久性味頗劣遇關亦可用此三品雖有精粗之  
分而均是真升麻用時去鬚水洗剉細若黃精自然  
汁浸一宿暴乾剉蒸再暴之制則不取數十年來此  
邦醫人所用藥鋪呼ミナモト和升麻者卽海根及春雪草二  
種之根此物味滯淺赤褐色大異于升麻花葉亦不  
相似醫人不識辨撰因仍習弊通用此物謬誤特甚  
吾門決不可用此物辨正張元素曰升麻升陽氣於

至陰之下李杲曰升麻升胃中清氣又引甘溫之藥  
上升以補衛氣之散自此二氏創作鑒說後之醫流  
動輒說升提抑何濫拘升字乎又李杲制補中益氣  
湯方中用升麻羌胡二品後世崇用此方以爲古今  
名方傳會陋說曰升麻引陽明清氣自右邊上行羌  
胡引少陽清氣自左邊上行吁亦妄也哉一盲引衆  
盲遂乃吠聲之徒轉相雷同惑世誣民如此之甚若  
然則每方當加此二品可也豈其然乎况方亦杜撰  
無甚奇古方中如此者不可勝舉奚足哉奚足哉

一本

堂藥撰

升麻 和漢共ニ有リ和二五種アリ其中宜審擇  
鳥足艸<sup>トリノアシ</sup>粟盛草<sup>アヲモリクサ</sup>野苧麻<sup>ノノ</sup>水引草<sup>ミヅヒキクサ</sup>此四種ノ根ヲ以テ  
升麻ニ充ルハ誤ナリ鳥アシ粟モリノ二種ハ綱  
目升麻集解ニ出セル落新婦ナリ卽小升麻ト名  
ク野マヲノ根ハ野苧麻根也水引草ハ海根ナリ  
皆升麻ニ非ズ不可用真ノ升麻ハ近來出ツ和名  
水筆ト云京都藝花家ニテハアハボト云是本草  
原始所謂鬼臉<sup>オウセン</sup>升麻ナリ又一種葉石龍芮葉ニ似

タルモノアリ是雞骨升麻ナリ味薄シ 既濟公

升用藥  
麻須知

升麻 ミヅフデ トリアシ升麻 アワモリ升

麻 アワボ升麻 ミヅビキ升麻ト云其中二三

ヅフデ アワボト云名真ナリホノ長サ六寸ホ

ドアルヲ真トス 集解ノ落新婦ト云ハ御藥苑

ニアル升麻ナリ類同ジアハボヨリハ小ナリ別

本ニ升麻ミヅフデ雞骨升麻上品ナリ鬼臉升麻

上品ナリ鬼顔升麻落新升麻ハ小升麻ナリトリ



アシト云 雞骨升ハ本草原始ノ鬼臉升麻子

リ本草  
會誌

撰修曰數十年來此邦醫人所用藥鋪呼和升麻者  
卽海根及春雪草二種二根齋按海根形狀氣味  
與所謂和升麻雖近似而割之文色大異是其古來  
所誤用者唯是亞哇攸幾而已△辨正曰張元素曰  
爾爾李杲曰爾爾自此二氏創作鑿說後之醫流動  
輒說升提抑何深拘升字乎又李杲制補中益氣湯  
方中有升麻柴胡二品後世崇用此方以爲古今名

方云云」齋按象氏醫略正誤雖辨世醫誤用補中  
益氣湯之誤而間亦不可不用益升麻芩胡上升之  
効自非誤治不可得而知也客年春初承地酒家患  
目赤羞明予乃投崔氏八味丸二旬而安同年夏初  
復心腹痞滿不食誤與益氣湯服二日後新病未除  
舊病復起因再投八味丸一旬而目疾全愈食亦稍  
進於是欲試升芩又投益氣湯服三日而目疾復起  
食亦減後固守八味丸而得全安矣又同時滌家患  
眩暈予乃投益氣湯服五日而瘥同年夏復小便短

滿胸膈痞脹頭面浮腫乃以爲濁氣在上治法令清  
氣升濁氣則應自降依舊與益氣湯服三日而諸症  
益劇因試前方中除去升芪服旬日漸平方此時又  
欲試之與其全方三日後劇復如舊再除升芪而得  
全安矣可見其升提之効著也喻如善釣者引魚于  
千仞之下乎是不止予試効因本書言之亦有可謂  
者夫升麻莫有燥濕利水補氣益血破瘀導滯溫中  
祛寒疎腸胃或滿等能也治所謂久泄胃泄崩漏下  
血久痢者何邪或張元素曰補脾胃李時珍曰行瘀

血者亦唯因升提然與瀉之補芎之行大異竊以諸家本草每品舉其功能者多亦何足算也竊其本乃不過一二言而已矣餘皆以此及彼者也今夫至升麻雖有若干功能亦特歸乎升提之一事矣何者凡人之有生也以陽為主以胃爲本故清陽下陷則濁陰上陟譬猶春月錯謬霜雪屢降而胃氣不行脾氣衰脾氣衰穀食不化於是乎于內于外疾病蜂起當此時其見證之主藥加此物以與之一升提下陷之陽則如日方中天萬化之行而脾胃之氣



忽旺氣血充足周流而瘀滯邪穢無地於容身惡乎  
有病不治者哉○或問曰此物無升提之能也修德  
亦其有所試言之矣而今與吾子所試乖畔者何也  
齋答曰修德亦縱有二三誤投考而其人皆以下元  
壯實故幸不蒙上升之害也矣 又曰傳會陋說曰  
升麻引陽明清氣自右邊上行芫胡引少陽清氣自  
左邊上行吁亦妄也哉 齋按此說以臍臟之次舍  
與藥性之主治自外察焉耳秦越人之明華元化之  
巧安能得知乎 又曰若然則每方加此二品可也



豈其然乎」齋按此說百病皆以爲無不兼陽氣下  
 陷耶吁甚哉言也 又曰「況方亦無甚奇古方中如  
 此者不可勝舉矣足哉」矣足哉」 齋按此說如以五  
 十步笑百步雖執古方用而中青紫謂無甚奇可哉  
 唯是在醫之巧拙而非方藥所與知夫醫者由射於  
 百步之外也其至藥力也其中非藥力也非藥

淡盛草アハモリ

高一二尺一莖數朶葉似草蓮花而畧圓

三四月開白花細小似花芒ハナスズキ之穗或曰本草中落莉

婦卽是也△

繡線菊

和名下野水筆シモツケ

高尺許葉

如芹葉而厚三葉有鋸齒四五月開花白色形如粟

穗又似筆頭或曰本草鬼臉升麻乎

物品  
目錄

落莉婦 和名アハモリ卽升麻ノ類詳二本草升

麻ノ集解中二三エタリ

繡線菊

一名麻毬高

二三尺一根叢生一房數百枚四瓣紅花如綴綉故

名一種白花者謂之白豐仙和名シモツケ見洛陽

名苑記及三才圖會遵生八牋等書ナホ近時ナホクサシモ

ツケトスルハアヤマリ麻葉トハ麻ノ一尖ヒトトガリニ似

タルト云コトナリ全葉が大ア麻サニ似タルト云コ

トニハアラズタトエバ藜蘆ヲ校欄ニ似ルト云

モ其一尖ヲ云ノミ全葉ヲサスニアラズ廣大和  
水草

既濟公アハホ  
ミヅフデ 事物異名 ○山谷背陰樹下

ニ多ク生ズ春苗ヲ宿根ヨリ發スソノ葉地錦ニ

類ノ花齒ニタレミアリノ子ニ三枝九葉一梗ニ結シ根頭

ニ叢生ス淺綠色ニメ堅滑ナリ夏ニ入テ漸ク幹

ヲ抽ズルコト尺餘秋ニ至テ半以上小花穂ヲナ

ス五出ニメ紅白色ナリ花中白鬚ヲ吐クコト多

シ葉落テ愈盛ナリ略ハ小米穂ボニ類ス衆ヘテ後小

角子ヲ結ブ一種肥大ニノ等ノ高サ三四尺ニ及

ビ數枝ヲワカツモノアリ皆ナ霜威ヲ畏レテ萬

葵ス花

升麻 トリノアシダサ延喜式 ウタカダサ和名

アハボ ミヅアデ肥後 サラシナ イハダラ

越後 イハンタイラ佐州 モクダ同上 一名既濟公

韋耕 雄脚村家 升麻ノ花ハ粟ノ穂ノ如クニ

ノ白色又筆頭ノ形ニ似タリ故ニ アハボ凡三

ヅフデ凡名ヅク春宿根ヨリ新葉ヲ叢生ス凡三

枝九葉ヲ一葉トス又九枝二十七葉ニモナル其  
一葉ヲ離セバ地錦葉ノ形ノ如シ厚クノ光澤アリ  
莖ハ細ク硬ク光アリテ粟ノ稈ノ如シ夏月長  
ス肥タル者ハ穂ニ數枝ヲ分ツ花大サ三分許六  
瓣初ハ白色微紅開ケバ白クノ内ニ白莖多クアリ  
テ絲ノ如シ満開スレバ瓣ハ見エズノ莖ノミ  
見ユ瓣モ又早ク脱シ絲ノ三殘レリ市ニ鬻ク根  
ハ唐升麻ヲ上品トス根大ニノ外黒ク内白シ是



鬼臉升麻ナリ朝鮮ヲ中品トシ和ノ升麻ヲ次ト  
ス和ノ升麻ノ中ニ數品アリ根色黒キヲ上品ト  
ス日光升麻ハ根大ニノ色黒シ唐ヨリハ色淺キ  
故ニ燒黒クシタル者アリ日光升麻ノ葉ハ狹窄  
ニノ苗高サ五六尺ニ至リ枝ヲ分チテ花ヲ開ク  
藥肆ニテ和ノ升麻ノ中ノ上品トス唐ニ次トス  
又野カラマツサウノ根ヲ燒黒クメ偽ルモノア  
リ故ニ日光ノ土人ハ野カラマツサウヲ升麻ト  
呼又諸州ノ深山及江州伊吹山ノ産ハ根細ク外

黒肉青ク堅實ニノ味極テ苦シ此ヲ藥舗ニテ眞  
ノ升麻ト云是雖骨升麻ナリ唐山ニテハ此ヲ佳  
品トス又此外大葉升麻三葉升麻アリ皆アハボ  
ノ一種ナリ古ハ升麻ヲトリノアシグサト訓  
ズ今ニテハ別ニ一種ノ草ヲトリノアシ升麻ト  
云此草向陽ノ山ニ多シ加條葉ニ似タル者九枝  
二十七葉ホド著モノ一葉ナリ夏莖ヲ抽デ花ヲ  
開ク真ノ升麻ヨリ早シ穂ハ長大ニノ枝多ク花  
數甚ダ多シ花ハ尤細小ニノ一分ニ盈ズ色白シ

又淡紅色ノ者アリ此ヲ　アハユキサウト云此  
ニ小葉ノ者アリ葉ノ枝數アハユキサウヨリ又  
多シ其餘形狀同ジコレヲ　ナツユキサウト云  
花ハ白色亦淡紅色ノ者アリ又アハモリサウ一  
名アハモリ升麻ト云アリ能刈ニテ　ヨメオド  
シト云苗ナツユキサウヨリ短小ナリ葉細長ク  
ノ當歸葉ノ如ク厚シ花ハ　ナツユキサウヨリ  
早ク開クトリアシ升麻ハ根皮赤黃色又赤色ナ  
リ故ニ　アカ升麻ト云古ハ藥肆ニ此ヲ賣テボ

ウデ　ク、リデト云アリ又皮ヲ削リタルヲ

ケヅリ升麻ト云リ卽集解ニ謂ユル小升麻一名

落新婦ニノ升麻ノ下品ナリ其アハモリ升麻又

其下品ナリ又古ハ金線草シキキヤノ根ヲ升麻ニ偽リ賣

故ニ　タデ升麻ミヅヒキ升麻ノ名アリ細葉升

麻ノ嫩葉ヲ日光ニテハ菜トシ食フ故ニ　サラ

シ菜ト呼花戸ニテ　ヤサイ升麻ト名ヅク　集

解落新婦　アハエキサウ又絡新婦ハ女郎グモ

ナリ蜘蛛ノ條下ニ出

本草綱目啓蒙

或問升麻有數品可擇用者何是曰今人充升麻者  
有五種野苧麻卽俗呼之ヲ那ノ馬マ澳オ海根ヘ卽俗呼之ヲ迷  
紫ヅ虛ビ結キ落ロ新婦ニ一名小升麻卽俗呼之ヲ盍ア划ハ麼モ麼リ又  
呼之ヲ脫ト麼リ盍ア十シ升麻苗高一二尺葉似麻葉而青色  
五六月開花成穗宛如粟穗白色六月以後結實黑  
色俗呼之ヲ迷ミ紫ヅ虎フ德デ者是也乃水草原始所謂鬼臉  
升麻也又一種有葉似石龍芮者卽是雞骨升麻也  
已上之四種俱非真名升麻者處處有之不可不詳  
辨究草木  
辨疑



川升麻 セウマナリ ○升麻 周麻 ミツフデ

唐青手佳ナリ和日光真ナリ ○鬼臉升麻 セ

ウマナリ ○落新婦 セウマナリ ○雞骨升麻

セウマナリ 藥品手  
引草

下野 シモツケ 線繡菊 花ノカタチサクラ川草ノゴト

ク本紅色葉モミダニ似テ莖ホソシ白花有リウ

スイロアリ白花ノ方ハ葉アツクキレアサシ草 ヤブ

下野 シモツケ トイフアリ日光シモツケトモイフハナ葉

氏ニ紅ノ方ニヲナジクサダチノビズ小草ナリ

鳳凰草ト云モハナ葉トモニ同ジハノキレコミ  
シモツケノ葉ヨリハ丸シ三種トモニ同ジモノ  
ナリ五六月花アリ繪水野山草

升麻 トリアシ アハモリ○京ニテアハボト

云下野陸奥ニテモクダト云同國ニテ葉ヲクサチヤ又ニガチヤト

云物類稱呼

升麻 漢渡ヲ用ベシ和名ミヅアデ肥後隈本 一名

サラシナ河内金剛山上品備中平福豊前中津次  
之其外諸國ヨリ出ツ落新婦白花ノモノヲ飲モ

リト名ク山城白川山ニアリ種類多シ近江ノモ  
ノハ葉大丹後ノモノハ葉草シモツケニ似テ大  
岐缺アリ花白シ一種圓葉ノ者アリ又市家ホタ  
ル草葉ニ似テ花胡黃連ニ似タル者大外麻トス  
真ニ非ズ 本邦外麻三枝九葉三枝三葉ノ者真  
ナリ朝鮮ハ根黒ク擁腫シ大ナリ蜀外麻フクレ川外麻  
蜀ノ川中ヨリ出ルヲ以テ名ク雞骨外麻用藥須  
知ニ見ユ一名シカナ 筑千金方  
紫藥註

升麻 和産種類甚多シ不可漫用近世真ノ升麻

ヲ出入形狀氣味本草二相合リ

本草正譌

升麻別錄東璧引具氏本草云升麻一名周升麻今

按具氏本草無周升麻之名太平御覽引本草經曰升麻一名周升麻證類本草作周麻卽脫升字證類脫簡文義不相接者東璧搜索御覽以補其闕若不有御覽何以知證類脫誤而今以爲具氏則可謂欺

後世矣

本草綱目鈎衡

具崑升麻葛根湯考云冬月應寒而反大溫民受其濕厲之氣名曰冬溫非時不正之氣由鼻而入皮毛

未得受邪故無汗

**牡靡**

酈道元水經註牡靡

音麻縣名

云牡靡可以解毒百卉方盛鳥多誤食鳥喙口中毒

必急飛往牡靡山啄牡靡以解毒也李奇註漢書云

牡靡卽升麻也而段柯古云牡靡不知何藥也蓋失

考耳予謂方書云無犀角以外麻代之朱二允辨其

誤然若用此縣之產其效宜不減于犀角焉薩州曾

士考 昌啓 云牧當是收訛收周同音本草升麻一名

周麻可以證焉

通雅作醫賸收靡縣

升麻一名旣濟公

事物異名

訖里瑟拏 梵書

和名

ウ



タカグサ 水草 和名

トリノアシグサ 同上

ウタカタ

グサ 藻鹽

モクタ 奥州

ミヅフデ 肥前 肥後

武州豊

島郡王子邊野州日光山中其餘處々山陰ニ生ズ

春宿根ヨリ苗生ス葉ハ獨活葉ニ似テ鋸齒アリ

三枝九葉或ハ十枝餘ニノ三十葉ニナルモノモ

アリ深緑色光澤アリ秋月莖高サ二三尺稍ニ總

ヲナシテ形粟ノホノ如シ數花簇生ス小ニメ六

瓣白色内ニ白葉縁ノ如シ根指頭ノ大サ連珠ノ

如ニノ鬚アリ一年一塊ヲ生ス形蒼朮ノ如ク皮

青黒色肉白ク青緑色ヲ帶ブ味苦シコノ物弘景  
ノ説ニ皮青緑色謂之雖骨升麻ト云ヒ又蘇頌ノ  
説ニ著花似粟穗ト云モノ是ナリ一種葉細ニシ  
テ川芎葉ノ如ク穗ニ枝ヲ生ノ白花ヲ開ク形狀  
アハボノ如シ根塊多シ此品藥用ニ上品ナリ一  
種大葉ノモノアリ一枝三葉或ハ三枝九葉ヲナ  
ス其一葉ハ秋海棠ノ如クニノ鋸齒深ク深綠色  
葉心ニ莖ヲツク根ノ形アハボ升麻ノ如シ以上  
三種真ノ升麻ニノ藥用ニ入ベシ又一種信州草

津ニ産スルハ一根叢生シ葉ハ白根莖ト髣髴ト  
シテ根鬚長ク夏月花ヲ開ク枝ヲ分チテ梢コト  
ニ升麻花ノ如クニシテ大ナル花藥アリ白色白  
糸ノ如シ又一種武州大嶽山中ニ蓮花升麻一名  
袖フリ升麻又クサレンゲト呼モノアリ武州御  
嶽野州日光等ニアリ葉ハ川芎葉ニ似テ莖紫色  
夏月莖ヲ抽テ莖頭ニ一花ヅ、開ク形白蓮ノ如  
クニノ小ナリ錢ノ大サニメ下ニ向フ根ハアハ  
ボ升麻ニ似テ細長ナリ舶來ノ升麻ハ肥大ニメ

皮黒ク肉白シコレ鬼臉升麻ナルベシ朝鮮升麻

ハコレニ次ク和産ハ皮黒肉青白色ノモノ上品

ナリ野州日光山及江州伊吹山ノ産并上品ナリ

コレヲ藥店ニテ真ノ升麻ト云コレ鷄骨升麻ノ

一種ナリ延喜式ニ升麻ヲトリノアシダサト訓

スルニ因テ後世トリアシ升麻ト云凡升麻ノ屬

ニ非ズ根ニ黄赤色ノ毛皮アリ肉淡紅ニシテ升

麻根ト大ニ異レリ赤キユヘ俗ニ赤升麻ト云コ

レハ處々山中ニ多シ莖葉ニ毛黄赤毛アリ葉ハ

擇葉ニ似テ穗枝多シ又コレヲ先輩藏器説ト

コロノ落新婦

同名アリ女郎タモニモ落新婦ノ名アリ

一名小升麻

ニ充ツルハ不穩落新婦ハ全ク升麻ノ一種ニノ

小ニノ下品ナルモノト見ユ又トリアシ升麻ノ

一種ニ白花ノモノアリ葉莖凡ニ長大ナリ一種

キジノオト云アリ花形色衆ノ花ニ似タリ葉ハ

シデノ如シ又樹藝家ニテハアハモリサウト呼

アリ葉深緑色花白シ穗ノ形トリアシト同ジク

タニ短シ以上數品升麻ノ類ニ入ルハ非ナリ



又花戸ニテナツユキト云アリ葉ハ莧麻ニ似テ  
小ナリ花ハ繡線菊ノ如ク紅色ナリ又クサシモ  
ツケト云アリコレモ葉ハ莧麻ニ似テ細鋸齒ア  
リ葉ノ莖ニ小葉ヲ附ス花白色シモツケノ如シ  
コノ二種根ノ形トリノアシニ似タルユヘ升麻  
類トスルハ又非也又別ニ日光ノ方言ニ日光升  
麻ト呼ヒ食料トスルモノハ野カラマツサウノ  
ナリ又ミヅビキ升麻ト云アリ藥店ニテコノ  
根ヲ升麻ニ偽リ賣ルコレ重楊柳ニノ即ミヅビ

キナリ此二種別物ナリ用エベカラズ口舌瘡痒

升麻一兩黃連三分爲末綿裹含嚙ム

本草  
穿要

升麻

ミヅフデ

肥前  
肥後

武州豊島郡野州日光山

其餘諸國ニ生ズ葉ハ三枝九葉ヲナシ獨活葉ニ

似テ硬ク光澤鋸齒アリ莖高サ二三尺粟ノ穂ノ

如ク白蕊ヲ吐出ス花甚小ニシテ六瓣ナリ根一

年一塊ヲ生ノ皮青黑色肉青白色味苦シ

一種

大葉ノ物 俗ニ鬼臉升麻ト呼ブ一莖三葉其一

葉甚大ニノ秋海棠ニ似テ鋸齒アリテ鬼臉ノ如

シ葉中ヨリ莖ヲ着<sup>ツ</sup>

一種 細葉ノ物 武州飛鳥

山下ニ多シ葉ハ川芎ノ如ク穗ニ枝アリ根ハ數塊連簇ノ皮青黒色肉青緑色ニシテ舶來ノ品ト同  
ジ弘景説トコロノ雞骨升麻コレナリ 一種ク

サレンゲ 武州御嶽野州日光山等ニアリ葉ハ  
前種ニ似テ莖頭ニ一花ヲ開ク形白蓮ノ如クニ  
シテ小ク心ニ紫ヲ帶ブ花ミナ下ニ向フ根ハアハ  
ボ升麻ニ似テ細長ナリ 一種 信州草津山中

ニ生スルモノアリ葉ハ白根<sup>シラネ</sup>アフヒニ似テ花ノ

形アハボノ如ク白蘆アリ根ニ蘆頭アリテ長キ

鬚アリ一種 八大島ニ産スルハ葉ニ光澤アリ

白色ニシテ微黄ヲ帶ブ一種 白花ノトリアシ

莖葉トモニ長大ナリ又一種花黄色ナルヲキ

ジノ尾トイフ一種 アハモリサウ 苗葉短ク

葉深緑色光澤アリ花純白色ナリ一種 トリノ

アシタサ延喜式 葉ハ櫟葉ニ似テ枝多ク花淡紅

色細碎根ニ黄赤毛アリテ肉淡紅ニシテ升麻根

ト異レリ以上四種三ナ落新婦一名小升麻ニ充

ルハ穂ナラズ小升麻ハアハボノ一種ニシテ下  
品ナルモノナルベシトリアシ類ハ升麻ノ屬ヲ

去ルコト遠シ本草  
圖譜

トリノアシ升麻  
延喜式 ○ホソバノトリノアシ

シヨウマ落新婦  
升麻 店赤升麻ト名貨ル非ナリ ○ニツク

ワウシヨウマ升麻  
本綱 山ニ出ス上品ナリ藥用ニ宜シ今

藥店カラマツ草ノ根ヲ取リ升麻ニ偽○ニガチ

ヤ升麻  
下野 本綱十三 ○イハダラ升麻  
越後 ○ウタカグサ

升麻 本草和名 ○ウシコロシ落新婦  
總州高 ○オシグ



サ升麻 醫心方 ○クサチヤ 升麻下野 ○ナツユキ 落新婦

麻集解 ○アハユキサウ 升麻一種真物ニ ○アハモ

リ同上 ○アハボ 升麻 ○アカシヨウマ 小升麻

解 ○サラシナ 本網十二 ○ミツバノアハボ 三葉

野刈 ○モクダ 本網十三 ○ヨメヲドシ 落新婦

ハモリ ○サイエウノトリノアシシヨウマ 落新婦

麻集解 小升麻ナリ 和州ニ出ツ 本草藥名備

藥店赤升麻ト名ケ貨ル 非ナリ 考和訓鈔

升麻 トリノアシクサ 雞骨ト云ハ鳥ノ足也

葉コマカニメ塗長シ小升麻ト云ハ葉大ニメセ

升麻

四七

イヒクシテ花穂長シ花ハ相同ノ穂ヲナシ白色  
ニノ糸ノ如シ鬼臉升麻ト云ハ葉大ニノコハク  
鋸齒アラク鬼臉ノ形ヲナス高一尺許リ加州ヨ  
リ小升麻ノ甚小ニノ矮生ノモノ來ル从產葉形  
少ツ、カハレリ○蓮花升麻一名袖フリ升麻ト  
云ハ竹節人參ノ葉ニ少シ似タリ莖フトク紫色  
ヲ帶長ク抽テ枝ヲ分チ花ヲ開淡紫色ニノ葩ア  
ツク蓮花ノ形アリ下ニ向テ咲常ノ升麻ニ異リ  
日光其外諸山ヨリ來ル○雪ボロ 此類赤升

麻ノ各品ニノ皆花葉相似テ小異アリ

大雪ボ

口 更科草ノ花葉ニテ粗大也

○更科草

雪

ボロニ似テ葉コマカニ花穂モ少クシマリテ見

事ナリ

○八丈升麻

八丈ノ産ナリ葉赤升麻

ヨリ大ニノ甚コハク光アリ

花穂更科等ニ似タリ

○赤升

麻

野生多シ葉小ニノ毛有リ莖長ク花淡紫色

又白花モアリ ○白狐草

雪ボ口更科草ニ似テ

葉ハ濶大ニノ薄シ花穂モ相似タリ ○泡モリ

泡モリ

草立ニシテ葉コハク直立ス花穂ハ相似テ密也

又葉ニ黄色ノ斑ノ入モ  
ノアリベツカウト云

○夏ユキ

花色三品ア

リ莖葉大ニノ楓葉ノ形ヲナスモノハ花色ホン

ノリトシタルベニ色也葉莖凡ニ小ニノ緑色ノ

モノハ白花也 地錦鈔ニ初雪草ト云莖葉相似

テ色アルハ花淡紅色也夏雪ヲ聚本氏繡麻ト云

或云淡霞菜

百花天  
工區別

升麻アハ水綱目

周麻同上

既濟公輟耕錄

サラシナ ス

ヒ、ツ 近世真ノ升麻トヨブモノ是ナリ宿根

ヨリ苗ヲ生シ葉ハ一枝ガ九葉ヅ、アリヒトツ

ヒトツニハナシタル時ハツタノ葉ニ似タリ一  
根ヨリ數莖生ズ粟ノ幹ニ似テカタクシテ節墨  
シ莖ノ末ニ穗ヲナシ長サ尺斗ニシテ二分ホド  
ヅ、六瓣ノ小花ヲ開キソノウチ白キ糸ヲ出シ  
テ見事ナリ

四季實  
花集

升麻 醫心方云烏乃根草又云於士久佐本草和  
名云烏趾草又云干多加久左種類頗多長梗細葉  
者俗謂之烏趾其莖微似鳥脚所云烏根烏趾蓋指  
此草耳或以爲落新婦陸奥山中者巨大而有赭毛



又一枝三葉深綠光澤其根外黑內白者謂之水筆

卽鬼臉升麻也緊實苦辛者爲良今產於紀伊豐後

播磨信濃上野其味比漢渡稍淡陸奧諸山殊多云

又長葉而花如簪芒者謂之栗穗其細葉者曰小升

麻蓋落新婦也又葉如葶麻花紅者謂之夏雪ナツユキ此李

荀花品所謂綉麻也

本草綱目纂疏

夏雪草布ナツユキ

宿根葉アサノ葉二似テ夏細力ナル

紅花咲夕布八間ノ白布ナリ

並ナレバ

○白花夏雪

草

宿根

一名鳥ノ足草葉ガタハ大根草ニ少

シ似クキ細ク白花右紅花ノ品トハ別種ナリイ

マダ所持セザルエヘ持カタ知ズ草木錦  
葉集

シモツケ草下毛大和本草  
繡線菊群芳譜 蕙畝ハ麻葉繡毬ノ

一種也トイヘリ水ニモシモツケト云アリ小水

ニテ葉ハヤマブキノ葉ニ似テ厚ク皺アリ高サ

二三尺ニナル花ハ草ノシモツケニ同ジ草ノカ

タハ五月ヨリ咲出シ盛リ久シ水ハ六七月ヨリ

八月マテモ咲タ粉紅色ニシテ盛リ久シ篤信曰

初夏發細紅花一朶群開如敗醬 夏タサノ露タ

キ中ノシモツケニ室ノ八島ノコトヤトハマシ

毎日本漫筆  
首為家漫筆

落新婦 アハユキ草 アハモリ草 一名小升

麻 本綱升多識  
麻條正名

サラシナシヤウマ 升麻 既濟公輟耕錄  
△イヌ

セウマ 升麻一種 △トリアシセウマ 落新婦

チダケサシ 落新婦一種 △セウマ 升麻ナ

リ△アハモリセウマ 落新婦物品識名

升麻 一周麻 弘景曰好者細削皮青綠色謂之雞  
骨時珍曰今人惟取裏白外黑而紫

實者謂之舶來多シ其形大ニノ外黒ク裏白シ是  
鬼臉升麻

卽鬼臉升麻ナリ 和産數品アリ藥舗ニ售トコ

口ノ真ノ升麻ト呼モノハ舶來ニ同ノ卽鬼臉升

麻ナリ 今朝鮮升麻ト称シ售又ア力升麻一名ナ  
モノ多クハコレナリ

ガ升麻ト呼モノハコノ中逆珠ノ形ヲナス 赤黃  
モノヲクリ升麻ト云

色或ハ赤色ニノ氣味薄シコレハ落新婦一名小  
トアシヤクニ

升麻ニノ下品ナリ雞骨升麻ハ藥舗ニ未出 日用  
サシキ

考

升麻 周麻 雄脚 △唐 上品トス鬼臉升麻ナリ △

朝鮮 今藥鋪ニ多出ツ△和產 根黑色ニア肉

青色ヲ帶テ細キモノヲ雞骨升麻ト云是真物ナ

リ△赤升麻 トリアシ升麻ト云即小升麻一名

落新婦ナリ

手板  
發蒙

升麻

ミヅ  
フデ

生陰地春生苗高二三尺三四月開花

升麻手足陽明太陰引經的藥味甘苦微寒無毒

清胃火寧腹痛下陷者可提升牙瘡者立止球陽者

堪用產西岐者色綠發萌收貯須照綱目

壬寅  
陸澍

俗

名升麻載在綱目

甲辰戴道實問  
光戴昌蘭本草



既濟ハハ公明余庭壁ハハ侯ハハ一膏

升麻功用胃熱喉腫ハハ別錄曰升麻味甘苦平

微寒主解百毒辟瘟疫瘴氣邪氣中惡腹痛時氣毒

癘頭痛寒熱風腫諸毒喉痛口瘡ハハ此物生深山寒

陰之地其根作塊色紫黑氣味苦收涼降故其功用

清胃中鬱熱解咽喉腫痛等升麻鼈甲湯陽毒之為

病面赤斑斑如錦文咽喉痛唾膿血麻黃升麻湯傷

寒六七日大下後寸脈沈而遲手足厥逆下部脈不

至咽喉不利唾膿血ハハ云撰品升麻有數品其舶來

升麻

者形似老薑而肥大皮紫黑肉帶褐色有羅文者爲上品所謂鬼臉升麻是也又朝鮮產形似漢產而黑色亦可用邦產總稱真升麻凡根肥大色黑味苦者可最用出日州野州羽州等藥鋪擇其好品僞呼朝鮮產或爲唐樣カラゲ又形瘠小皮黑肉白帶青色者呼阿遠樣アラサマ下品所謂雞骨升麻是也出江州伊吹又有三葉者有落新婦此二種不堪藥用古說以也ヤ加良末カラム都根ツ質之今不然○升麻春生苗葉似當歸而不滑澤秋抽一莖高二三尺梢頭發白花似粟穗狀根似

水而黑色多鬚

古方錄  
品考


本草通串卷四十八

本草通串 外家

本草通串



本草通串卷四十九



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

苦參

苦參味苦寒主心腹結氣藏瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚一名水槐一名苦蕒

神農

本經○大  
觀本草

本草

見

二

苦參

一



本草綱目

本草經曰苦參一名水槐神農本草經○  
太平御覽

苦參本經  
中品  
釋名苦藏本經  
水槐本經  
主治心腹結氣癥瘕

積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚本經

神農本草經○  
本草綱目

本草云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝逐水

除癰腫補中明目止淚神農本草○  
湯液本草

苦參味苦寒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚 水槐 苦藏神農本草  
○盧

復手  
錄

苦參味苦寒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚

神農本草經疏  
○吳懷祖輯要

苦參味苦寒主心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘瀝

逐水除癰腫補中明目止淚

神農本草經  
○百種錄

苦參味苦寒無毒養肝膽氣安五藏定志益精利九

竅除伏熱腸辟止渴醒酒小便黃療惡瘡下部蠱平

胃氣令人嗜食輕身一名地塊一名菟槐一名驕槐

一名白莖一名虎麻一名岑莖一名祿白一名陵郎

生汝南山谷及田野三月八月十月採根暴乾

別錄  
名醫

本草 ○大觀

釋名

地槐

別錄

菟槐

別錄

驕槐

別錄

白莖

別錄

又名

苓莖

白陵郎虎麻

集

解別錄

曰苦參生汝南山谷及田野三月八月十月

永根暴乾氣味

苦寒無毒

主治

養肝膽氣安五藏平

胃氣令人嗜食輕身定志益精利九竅除伏熱腸澀

止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部蠶

別錄

名醫別錄

○本草綱目

本草云養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏熱

腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部蠶平胃氣令

人嗜食輕身

名醫別錄 ○湯液本草

**苦** 从艸古聲 康杜切 說文

陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹故有槐名

花黃子作莢根味至苦惡病人酒漬飲之多差患疥

者一兩服亦除益能殺蟲

神農本草陶弘景  
註○大觀本草

雷公云凡使不計多少先須用糯米濃泔汁浸一宿

上有腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過卽蒸從

已至申出熬乾細剉用之

炮炙論○  
大觀本草

**根** 修治 敝曰承根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢氣

並浮在水面上須重重淘過卽蒸之從已至申取晒

切用炮炙論○  
本草綱目

別錄增炮炙論采根用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢

氣并浮在水面上須重重淘過卽蒸之從已至申取

曬切用炮炙論○  
廣群芳譜

玄參爲之使惡貝母漏蘆兔絲反藜蘆藥對○大  
觀本草

氣味之才曰玄參爲之使惡貝母兔絲漏蘆反藜蘆

藥對○本  
草綱目

主治治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜

睡治腹中冷痛中惡腹痛甄權  
藥性論○  
本草綱目



苦參一名綠白

駢香  
儷艷

唐本注云以十月收其實餌如槐子法久服輕身不

老明目有驗又云治脛酸療惡蟲

唐本注○  
大觀本草

**主治**

治惡蟲脛酸

蘇恭

○實

十月  
收

氣味

同根

**主治**

久服輕

身不老明目餌如槐子法有驗

蘇唐本注○  
恭本草綱目

苦參味苦寒無毒主心腹結氣藏癰積聚黃疸溺有

餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟

定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤

療惡瘡下部蠱瘡平胃氣令人嗜食輕身一名水槐

一名苦蕒一名地槐一名菟槐一名驕槐一名白莖

一名虎麻一名莽莖一名祿白一名陵邱生汝南山

谷及田野三月八月十月採根暴乾千金翼方

苦參為齒藥使人傷腎腰重博物志

久礼波奈 咏苦久微香之无毒六七月開花乎其

時採花乎陰乾大同類聚方

苦參久良々新撰字鏡

苦參一名水槐一名苦蕒仁譜音識一名地槐一名菟槐

一名驕槐陶景注云葉似槐樹故有槐名一名白莖一名虎麻一名

岑莖一名祿白一名陵郎

已上本條

一名祿光一名藝公

一名阮一名處麻一名委提莖一名顛槐一名使已上

七名出

釋藥性和名久良々一名永比利久佐

本名

臣禹錫等謹按藥性論云苦參能治熱毒風皮膚煩

燥生瘡赤癩眉脫主除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡

腹痛除體悶治心腹積聚不入湯用

蜀本草掌禹錫按○大觀本草

**苦**從艸古聲臣錯按曰魯反

說文解字通釋

山城國苦參苦參廿五斤○伊賀國苦參苦參廿斤○伊勢國

苦參苦參卅三斤○近江國苦參苦參卅九斤○越中國苦參苦參

十斤○丹後國苦參<sup>クラ</sup>十斤○出雲國苦參<sup>クラ</sup>十一斤○安

藝國苦參<sup>クラ</sup>十斤○周防國苦參<sup>クラ</sup>十斤○紀伊國苦參<sup>クラ</sup>廿

六斤○伊豫國苦參<sup>クラ</sup>十斤○土佐國苦參<sup>クラ</sup>九斤延喜式

苦參 本草云苦參一名苦蕒音 和名久良々一

云末比里久佐和名類聚鈔

日華子云殺疳蟲炒帶煙出爲末飯飲下治腸風渴

血并熱痢日華本草○  
大觀本草

圖經曰苦參生汝南山谷及田野今近道處處皆有  
之其根黃色長五七寸許兩指麤細三五莖並生苗

高三四尺已來葉辟青色極似槐葉故有水槐名春  
生冬凋其花黃白七月結實如小豆子河北生者無  
花子五月六月八月十月採根暴乾用古今方用治  
瘡癰最多亦可治癩疾其法用苦參五斤切以好酒  
三斗漬三十日每飲一合日三常服不絕若覺痺卽  
差取根皮未服亦良

圖經○大  
觀本草

**集解**頌曰其根黃色長五七寸許兩指粗細三五莖  
並生苗高三四尺已來葉辟青色極似槐葉春生冬  
凋其花黃白色七月結實如小豆子河北生者無花



子五月六月十月采根暴乾發明頌曰古今方用治

風熱瘡疹最多

蘇頌圖經  
本草綱目

成德軍苦參 秦州苦參 西京苦參 邵州苦參

三月八月十備急本  
月採根暴乾草圖按

苦參有朝士苦腰重久坐旅拒十餘步然後能行有  
一將佐謂朝士曰見公日逐以藥揩齒得無用苦參  
否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參入齒其  
氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦  
參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方

書不載者有人病遍身風熱細癢痒痛不可任連胃  
頸臍腹及近隱處皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參  
末一兩皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏  
和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水服二十至三  
十丸次日便愈

本草衍義○丹波元  
胤訂正重雕宋本

衍義曰苦參有朝士苦腰重久坐放拒十餘步然後  
能行有一將佐謂朝士曰見公日逐以藥揩齒得無  
用苦參否曰始以病齒用苦參已數年此病由苦參  
入齒其氣味傷腎故使人腰重後有太常少卿舒昭

亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用腰疾皆愈  
 此皆方書舊不載者有人病遍身風熱細癢痺痛不  
 可忍連胃頸臍腹及近隱處皆然涎痰亦多夜不得  
 睡以苦參末一兩皂角二兩水一升搗濾取汁銀石  
 器熬成膏和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水服  
 二十至三十丸次日便愈

本草衍義  
大觀本草○

**發明**宗奭曰沈存中筆談載某苦腰重久坐不能行  
 有一將佐曰此乃病齒數年用苦參揩齒其氣味入  
 齒傷腎所致也後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩

齒歲久亦病腰自後悉不用之腰疾皆愈此皆方書

不載者

本草衍義  
本草綱目○

衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛不可任連宵頭

臍腹近陰處皆然涎痰亦多不得睡以苦參末一兩

皂角二兩水一升揉濾取汁銀石器熬成膏和苦參

末爲丸如梧桐子大食後溫水下二十丸至三十丸

次日便愈

本草衍義  
湯液本草○

苦參曰水槐曰苦藹曰地槐曰菟槐曰驕槐曰白莖

曰虎麻曰岑莖曰裸白曰陵

昆蟲草  
水略

予嘗苦腰重久坐則旅距十餘步然後能行有一將  
佐見予曰得無用苦參潔齒否予時以病齒用苦參  
數年矣曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人腰  
重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰  
自後悉不用苦參腰痛皆愈

沈存仲夢  
溪筆談

**發明** 元素曰苦參味苦氣沉純陰足少陰腎經君藥

也治本經須用能逐濕

張元素  
本草綱目

心云除濕

李東垣用藥心  
法 ○湯液本草

時習云苦參揩齒久能病腰

時習  
湯液本草



發明震亨曰苦參能峻補陰氣或得之而致腰重者

因其氣降而不升也非傷腎之謂也其治大風有功

況風熱細疹乎

朱震亨  
本草綱目

苦參 氣寒味苦氣沉純陰心云除濕本草云主心

腹結氣藏癥積聚黃疸溺有餘瀝逐水除癰腫補中

明目止淚養肝膽氣安五藏定志益精利九竅除伏

熱腸澀止渴醒酒小便黃赤療惡瘡下部蠱平胃氣

令人嗜食輕身衍義云有人病遍身風熱細疹痒痛

不可任連胃脘臍腹逆陰處皆然涎痰亦多夜不得

以苦參末一兩皂角二兩水一升搗濾取汁銀石器熬成膏和苦參末爲丸如梧桐子大食後溫水下二十九至三十九次日便愈時習云苦參揩齒久能

病腰

湯液本草

苦參味苦寒無毒殺疳蟲治瘡毒苦參攻腸風並可

消痺破癥結

李杲藥性賦

鎖眉根

苦參輟耕錄

苦參味苦氣寒沉也純陰無毒田野山谷隨處有生採根曝乾嚼之極苦反藜蘆莫入惡貝母芫綵使宜

玄參惟作丸服

不入湯散

治腸風下血及熱痢刮痛難當

療溫病狂言致心燥結胸垂死赤痢眉脫者歐風有

功黃疸遺溺者逐水立効掃遍身癢癢止卒暴心疼

除癰腫殺疥蟲破癰疽散結氣養肝氣明目止淚益

腎精解渴生津利九竅通便安五臟定志子生作笑

十月堪叔亦明目輕身惟久服有驗

本草蒙筌

苦參味苦性寒無毒入胃大腸肝腎四經主結氣積

聚伏熱黃疸腸風燥渴溺有餘瀝逐水消癰明目止

淚去濕殺蟲療大風及一切風熱如疹以糯米泔浸

一宿去浮面腥氣晒用玄參爲使惡貝母漏蘆鬼絲  
 手反藜蘆 按苦參屬水有火性下降本入少陰已  
 又入手足陽明及足厥陰經者以其善主濕也發濕  
 勝則生熱濕勝則生風而結氣等症從茲有矣今以  
 苦參燥濕治其本也東南卑濕尤爲要藥丹溪曰能  
 峻補陰氣或得之而腰重者以其氣降而不升非傷  
 腎也 雷公云 凡使不計多少先須用糯米濃泔浸  
 一宿上有腥穢氣並在水面上浮並  
 須重重淘過卽蒸從已 錫補雷公炮  
 至申出曝乾細剉用之製藥性解

釋名 苦骨

綱目 野槐

綱目 時珍曰苦以味名參以功名槐

以葉形名也苦蕒與萊部苦蕒同名異物集解時珍

曰七八月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆

而堅氣味時珍曰伏承制雌黃焰硝主治殺疳蟲炒

存性米飲服治腸風瀉血并熱痢時珍發明時珍曰子

午乃少陰君火對化故苦參黃蘗之苦寒皆能補腎

蓋取其苦燥濕寒除熱也熱生風濕生蟲故又能治

風殺蟲惟腎水弱而相火勝者用之相宜若火衰精

冷真元不足及年高之人不可用也素問云五味入

胃各歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久



大之由也王承柱云入肝爲溫入心爲熱入肺爲清  
入腎爲寒入脾爲至陰而兼四氣皆爲增其味而益  
其氣各從本臟之氣故久服黃連苦參而反熱者此  
其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕  
故有暴大是以藥不具五味不備四氣而久服之雖  
且獲勝久必暴大但人疎忽不能精候爾張從正亦  
云凡藥皆毒也雖甘草苦參不可不謂之毒久服則  
五味各歸其臟必有偏勝氣增之患諸藥皆然學者  
當觸類而長之可也至於飲食亦然按史記云太

倉公淳于意醫齊大夫病鵠齒灸左手陽明脉以苦

參湯日漱三升出入其風五六日愈此亦取其去風

氣濕熱殺蟲之義

本草綱目

苦參味苦氣寒無毒氣沉純陰足少陰腎經主藥治

本經須用能逐濕

李時珍先生曰苦以味名參以功名生汝南山谷及田野近道處處

有之苗高三四尺

葉細碎青色極似槐葉春生冬凋花白七月結實如蒺藜莢內有子二三粒如小

豆而堅根三五莖並生

長五七寸兩指許大色黃褐味極苦惡河北生者無花子苗莖根葉皆相苦也五

六十月採根暴乾製法用糯米泔汁浸一

宿其腥穢氣並浮在水面切片曬乾用

○苦參桂

風瀉火爆濕去蟲之藥也化癥瘕散心腹之結氣逐

黃疸治脚氣之脛疼又治厲風癩疾遍身疥瘡甚則  
眉髮墮落并一切風癰風瘡搔癢風屑及時瘡破爛  
膿水浸淫或腸風下血腸痔痔血諸證統屬濕熱血  
疾之病也此劑苦可除熱寒可涼血燥可勝濕益東  
南之地皆是濕生熱熱生風風勝則下血熱勝則生  
瘡惟苦參皆可治也前人謂苦參補腎補陰其說甚  
謬蓋此藥味苦氣腥陰燥之物穢惡難服惟腎氣實  
而濕火勝者宜之若火衰精冷元陽不足及年高之  
人胃虛氣弱非所宜也況有久服而致腰重者因其

氣降而不升實傷腎之謂也何有補腎補陰之功乎  
書之不足盡信者以此 沈拜可先生曰苦參苦寒  
燥脾胃之濕熱兼洩氣分血分之濕熱故協治癰疽  
結氣黃疸便紅脚氣癰腫熱毒皮風煩燥厲毒疣瘡  
瘡癩諸疾由于風雨飲食濕熱而成者所以農皇本  
草云有安五藏平胃氣之功焉 廣濟方云臘月以  
米醋漬苦參入瓶中封固主一切天行熱病頭痛口  
渴身熱甚及發狂者飲杯許得吐卽止汗亦如之○  
治大麻風癩用苦參胡麻皂莢刺當歸川芎牛膝漆



葉龍膽草斬蛇○治久失餓之人驟食多食胃氣濕

熱薰蒸成黃爲疽證者用苦參龍膽草爲末作丸如

梧桐子大每服十餘丸○治童子胃熱羸瘦疳蛇用

苦參川黃連白朮○治齒縫出血用苦參一兩枯白

礬一錢共爲末日三搗之立驗○治肺熱遍身生瘡

用苦參末丸粟米大每服百餘丸白湯下

本草  
桑言

苦參山野隨處有葉青似槐故有水槐驕槐菟槐地

槐之名苦以味名參以功名

味苦寒無毒主心腹結  
氣癥腹積聚黃疸溺有

餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五藏  
定志益精利九竅除伏熱腸辟止渴醒酒小便黃赤



惡瘡下部蠶平胃氣令人嗜食輕身○苦參黃  
色長五七寸及尺許指粗細肉白嚼之極苦 雷

公云凡使不計多少先須用糯米濃泔浸一宿上有  
腥穢氣並在水面上浮並須重重淘過卽蒸從

已至申出曝本草  
乾細剉用之原始

苦參味苦氣寒沉也純陰無毒入心肝腎大腸之經  
治腸風下血熱痢刮痛難當療狂言致心燥結胸垂  
死赤癩眉脫者祛風有功黃疸遺溺者逐水立効掃  
遍身癢疹止卒暴心疼殺疥虫破癰疽散結氣明目  
止淚解渴生津利九竅通大便第過于迅利宜少用  
爲佐使不宜多用爲君臣至于益腎安五臟定志不



瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡明目止淚養肝膽氣除伏  
熱腸澀小便黃赤療齒痛及惡瘡下部蠱○處處有  
之葉極似槐故一名水槐一名地槐三月八月十月  
採根暴乾不入湯用本草○入足少陽經味至苦入

口卽吐胃弱者慎用糯米泔浸一宿蒸三時久晒乾  
少入湯藥多作丸服治瘡酒浸治腸風炒至烟起爲

大用

入門

○能峻補陰氣丹心

**實**以十月收其子餌

如槐子法久服輕身不老明目有驗

本草

東醫寶鑑

苦參 苦燥濕寒勝熱沉陰主腎補陰益精養肝胆

安五臟

濕熱去則血氣和來而五臟良安

利九竅生津止渴明目止

淚

肝熱為

治溫病血痢

純下清血者風傷肝也宜散風涼血下如荳汁者濕傷脾也宜

清熱

腸風溺赤黃疸酒毒熱生風濕生虫又能祛風

逐水殺虫治大風疥癬然大苦大寒肝腎虛而無熱

者勿服

張從正曰凡藥皆毒也雖苦參甘草不可不謂之毒久服必偏勝為患經曰五味入胃各

歸其所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久大之由也王承註曰氣增不已則藏有偏勝偏勝則藏有

編絕故令人暴夭筆談云久用苦參擦牙遂病腰痛由其氣傷腎也經又曰大毒治病十去其六常毒治

病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九穀肉菓菜食養盡之無使過之傷其正也按人參

補脾沙參補肺紫參補肝丹參補心玄參補腎苦參不在五參之內然名參者皆補糯米泔浸

去腥氣蒸用玄參爲使惡貝母兔絲子漏蘆反藜蘆

苦參一兩或酒煎或醋增訂本  
煮能吐天行時疫毒草備要

苦參稟天地陰寒之氣氣寒而沉爲足少陰腎經藥

甄權治熱毒風皮膚煩燥生瘡赤癩眉脫除大熱嗜

睡時珍治腸風瀉血皆以其苦燥脾胃之溼兼洩氣

血之熱也 同胡麻仁刺蒺藜荊芥菊花柿莢白芷

當歸川芎地黃天冬何首烏牛膝漆葉秦艽龍胆草

治大麻風 雖能洩血中之熱除溼熱生蟲爲癘然

氣味苦寒能損腎氣肝腎虛而無大熱者勿服火衰



精冷真元不足及年高之人皆不宜服本草經疏輯要

苦參味苦寒主心腹結氣苦入心以散熱結之氣癥瘕積聚極苦

則能黃疸寒能除熱溺有餘瀝心通于小腸鬱塞之氣通矣

逐水小腸通除癰腫清則癰腫自去也補中內經云脾

若濕急食苦以明目止淚寒清肝火○此以味為治

燥之即此義也

也苦入心寒除火故苦參專治心經之火與黃連功

用相近但黃連似去心臟之火為多苦參似去心府

小腸之火為多則以黃連之氣味清而苦參之氣味

濁也神農本草經百種錄

苦孔五切枯上聲五味之一書洪範火曰炎上炎上

作苦舉要別作𦵏非

正字通

白莖 苓莖 綠白 陵郎 虎麻 名醫別錄苦

參一名白莖又名苓莖綠白陵郎虎麻 苦藏 苦

骨 地槐 水槐 菟槐 驕槐 野槐 水草綱

目苦參一名苦藏一名苦骨又名地槐水槐菟槐驕

槐野槐槐以葉形名也苦藏與萊部苦藏同名異物

鎖眉根 清異錄侯寧極藥譜鎖眉根苦參也

事物

異名錄

苦燒次清孔五切枯上聲炎上之味字

增本草綱目

苦參一名苦蕒

與蔬郎苦蕒同名異物

一名苦骨

一名地槐一名水槐一名菟槐一名驕槐一名野槐

一名白莖別錄又名莽莖綠白陵郎虎麻

李時珍曰苦以味名

參以功名槐以葉形名也

蘇頌曰其根黃色長五七寸許兩指麤

細三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極似槐

葉春生冬凋其花黃白色七月結實如小豆子河北

生者無花子五六月十月永根暴乾李時珍曰七八

月結角如蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅氣

味苦寒無毒治心腹結氣癥瘕積聚黃疸逐水補中  
明目養肝膽氣安五臟平胃輕身定志利九竅除風  
熱止渴殺蟲療癰腫瘡疹瀉血熱痢彙考

後筆

談予嘗苦腰重久坐則踈距十餘步然後能行有一  
將佐見予曰得無用苦參潔齒否予時以病齒用苦  
參數年矣曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人  
腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病  
腰自後悉不用苦參腰病皆愈別錄增炮炙論永根  
用糯米濃泔汁浸一宿其腥穢氣并浮在水面上須

重重淘過卽蒸之從已至申取曬切用廣翠芳譜

藥類有苦辛衢州府誌

苦參本草圖經雖不言出地重修鎮  
然是境土所有故備錄之  
江府志

苦參葉青似槐故又有水槐地槐名松溪縣志

苦參本草曰一名水槐一名地槐苗三五尺葉碎

青色似槐故有水槐名其花黃白結實如小豆一名

崑崙草漳州府志

藥之屬有苦參史記齊大夫病齕齒太倉公以錢  
苦參湯日漱三升以去其風  
塘

縣志



藥類

苦參

遂安縣志

苦參苗高二三尺許葉極似槐春生冬凋其花黃白

七月結實作莢子如小豆根極苦一名地槐一名水

槐

八閩通志

苦參出封川水生大苦寒殺蟲

肇慶府志

苦參

一名崑崙草

揚州府志

苦參葉碎青色似槐一名水槐別名鬼槐地槐驕

槐春生冬凋苦以味名參以功名

崇明縣志

藥類

苦參

蕪湖縣志

苦參 田野處處皆生能治癩狂瘡癰十月採收山

縣志

苦參 苦以味名參以功名杭州府志

藥品 苦參莖三五並生葉似槐以味苦功類參故

名畿輔通志

苦 唐韻康土切集韻賴會孔五切音答味也書洪範

炎上作苦康熙字典

苦參 和名久羅羅又未比利久左異名水槐本經增補

異名 苦藟本經苦骨綱目地槐別錄菟槐別錄驕槐同野槐綱目

白莖別錄 苳莖同 綠白同 陵郎同 虎麻同 多識編

苦參 クラ、又マトリクサ 苦苳ワラ アレニケ

リワサ田ノアゼニクラ、オヒテ秋マツベクモ

ナキワタルカナ藻鹽

苦參 氣味 苦寒 異名 苦藟 苦骨 地槐 水槐

菟槐 驕槐 野槐 白莖 苳莖 綠白 陵郎

虎麻 和名 久羅羅 末比里久左 修治 三八十

月ニ根ヲ糸トリ土氣ヲ洗ヒ日ニ干シ米泔ニ浸ノ一

夜置テ腥穢氣ヲ去リ割ミ少シ焙ル或ハ酒ニ浸

スコト方ニ依ル能<sup>レ</sup>足ノ少陰腎經ノ君藥ニノ玄

參ヲ使トシ貝母兔絲子漏蘆ヲ惡ミ藜蘆ニ反シ

汞ヲ伏シ雌黃焰硝ヲ制ス○能<sup>レ</sup>本經ノ濕ヲ去ル

毒<sup>下</sup>元冷テ火衰ヘタルニハ忌ム年高ノ人真元

ノ精氣弱ニ忌ム○脾胃ノ虛弱ニ忌ム<sup>藥性</sup>能<sup>レ</sup>毒

苦參苦寒用糯米泔浸一宿其腥穢氣並浮在水面

上須重重淘過蒸乾少入湯藥多作丸服治瘡浸酒

治腸風炒至煙起爲末玄參爲使惡貝母兔絲子反

藜蘆

本草  
候禁

苦參 一名水槐神農本草 一名苦蕒同上 一名地槐名醫別錄

一名菟槐同上 一名驕槐同上 一名白莖同上 一名虎麻同上

一名岑莖同上 一名祿白同上 一名陵郎同上 俗名忽賴

賴 苦參 陶隱居云今出近道處處有葉極似槐樹

故有槐名花黃子作莢根昧至苦惡病人酒漬飲之

多差患疥者一兩服亦除益能殺蟲嘉祐補注本草 苦參

生汝南山谷及田野今近道處處皆有之其根黃色

長五七寸許兩指鹿細三五莖並生苗高三二尺以

來葉碎青色極似槐葉故有水槐名春生冬凋其花



黃白七月結實如小豆子河北生者無花子五月六

月八月十月採根暴乾用

本草  
圖經

苦參有朝士苦腰

重久坐旅距十餘步然後能行有一將佐謂朝士曰

見公日逐以藥揩齒得無用苦參否曰始以病齒用

苦參已數年此病由苦參入齒其氣味傷腎故使人

腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病

腰自後悉不用腰疾皆愈此皆方書舊不載者有人

病遍身風熱細癩痺痛不可忍連胸頸臍腹及近隱

皆然涎痰亦多夜不得睡以苦參末一兩皂角二兩

水一升揉濾取汁銀石器熱成膏和苦參末爲丸如

梧桐子大食後溫水服二十至三十丸次日便愈

宋寇

宗爽本草行義 苦參七八月結角如蘿蔔子角內有子二

三粒如小豆而堅

明李東璧本草綱目

予一族子舊服芎藭

醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族

子果無疾而卒又予姻家朝士張子通之妻因病腦

風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆予目見者又予嘗苦

腰重久坐則放距十餘步然後能行有一將佐見予

曰得無用苦參潔齒否予時以病齒用苦參數年矣

曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人腰重後有  
太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉  
不用苦參腰疾皆愈此皆方書舊不載者宋沉存中夢溪筆談

苦參苗高二三尺許葉極似槐春生冬凋其花黃

白七月結實作莢子如小豆根極苦一名地槐一名

水槐八閩通志苦參出封川水生大苦寒殺蟲肇慶府志物

類纂

苦參クライ

苦蕒

地槐

菟槐

水槐

並和爾同雅

苦參

苦蕒

苦骨

地槐

水槐

菟槐

驕槐

野槐 白莖 和名久良々 一云末比里久佐

本綱苦參生山谷田野其根黃色長五七寸許兩  
指粗細三五莖並生苗高三四尺以來葉碎青色極  
似槐葉春生冬凋其花黃白色七八月結實作角如  
蘿蔔子角內有子二三粒如小豆而堅又有無花子  
者氣味至苦寒氣沉純陰足少陰腎經君藥也最治風  
熱瘡疹除心腹結破癥瘕殺疳蟲惡貝母鬼絲漏蘆  
伏朮反藜蘆制雄  
黃焰硝凡苦參黃蘗之苦寒皆能補腎惟腎水弱而相  
火勝者用之宜若火衰精冷真元不足及年高之人

不可用也△按苦參形狀和漢同而丹波之產最良

淡州豫州今治藝州廣島次之帶黑色者不可

倭漢三才

會圖

苦參 春宿根ヨリ生スエンジュノ葉ノゴトク

草藤ノ葉ニ似タリ夏ノ比ウス黄色小豆花ノゴ

トクナル小花サク實ハサ、ゲノカタチナル物

一所ニ多クアツマリ付ク實モ根モ甚苦シ

廣益地錦

抄

苦參 和名 クラ、 所々多ク有之宿根ヨリ



莖ヲ生ス高サ二三尺葉ハ槐ノ如シ其末ニ花ヲ  
付ク槐ノ花ノ如シ故ニ野槐ノ名ヲ得ル秋九月  
ニ子熟スヨク黄菁ノ莢ニ似タリ根ハ藥用ニ可

用皆味大ニ苦シ

本草花  
蔣繪

苦參釋名時珍曰苦以味名參以功名修治洗土氣

米泔汁浸一宿去腥穢氣剉少焙或酒浸用氣味苦

寒無毒能入腎經心腹結氣癥瘕積聚黃疸溺有餘

瀝逐水除癰腫殺疥瘡下部蠶養肝膽氣明目止淚

治卒心痛腸澼熱痢毒惡貝母兔絲子反藜蘆若脾

胃虛弱人或火衰精冷真元不足及年高之人則慎

用〔釋名〕本書ノ如シ和名クラ、ト云〔能〕本書ノ如

シ此能種々アリトイヘバタゞ去濕熱藥ト意得

ベシ諸般ノ能タゞ一言デ貫クナリサレバ黃栢

苦參降氣ノ藥久服スベカラズ去濕熱一旦ノ藥

ナリ熱病時疫ノ結胸ニ用ユ結胸トハ胸ツヨク

痛ミ手モツケラレヌヤウニ痛ムモノナリ苦參

一味醋ニテ煎ジ用ユベシ即功アリ〔片玉六本草〕

苦參 和名クラ、原野不擇地シテ生ス黃花如

豆花結角<sup>ヲ</sup> 鎮眉根<sup>苦</sup> ○苦辛 苦參ノ和名ナリ

鷺掌風ヲ治ス 用藥 須知

苦參 クラ、<sup>延喜式</sup> アトリグサ <sup>古歌</sup> キツ子

ノサ、ゲ <sup>仙臺</sup> 苦辛 <sup>和方書</sup> カミナリサ、ゲ <sup>越</sup>

揪ト 一名鎖眉根 <sup>輟耕錄</sup> 鹿白 <sup>本草精義</sup> 板麻 <sup>藥</sup>

草 土槐 <sup>三才圖會</sup> 山野ニ極テ多シ宿根ヨリ春苗

ヲ生ズ高サ三四尺直立ス葉ハ槐<sup>モミ</sup>或ハ黃芪葉ニ

似タリ切バアヲクサシ夏月莖梢ニ淡黃色ノ花

ヲ開ク形小豆花ノ如シ又白花朵花アリ角ヲ結

ブ長サ二寸蘿蔔ノ莢ノ如シ秋ニ至レバ苗枯ル  
根黄色甚大ナル者アリ味至テ苦シ  
釋名時珍

曰與萊部苦蕒同名異物按ニ萊部ニ苦蕒ナシ苦  
萊アリ苦萊ハ即苦苣ノゲシナリ然レド苦萊ニ苦蕒ノ

名ナシコ、ハ龍葵フナスビト同名異物ト云フヲ誤リ書

スルナリ龍葵ニ苦萊苦蕒ノ名アリ又敗醬ヲミナメシニモ

苦萊苦蕒ノ名アリ又小酸漿コホウゾキニモ苦蕒ノ名アリ

本草綱目啓蒙

苦參 苦蕒 クラ、和藥 ○苦骨 クジンナリ

○苦辛 クジンナリ ○野槐 クジンナリ ○地

槐 クジンナリ ○菟槐 クジンナリ ○白莖

クジンナリ ○水槐 クジンナリ 藥品手引草

苦參 和名狐サ、ゲ 仙臺 六月莢ヲ結ブ根陰乾

ノ火上ニ焼キ鷲掌風ヲ熏ズ杖ヲ煎メ漆瘡ヲ洗

フ丹波上品淡路伊豫今張安藝廣島次之出雲ノ

人莖皮ヲ取り布ニ織ル光アリ 千金方藥注

苦參 和産甚多シ 本草正論

漢書文入葳蕤草出上黨本草遂謂後世因字文繁



遂以參星之字代從簡便爾然而前漢史游急就篇  
遠志續斷參土瓜顏師古註參謂人參丹參紫參玄  
參沙參苦參也又王符潜夫論云治病當得人參反  
得羅服則本草之言不必矣醫賸

苦參

和名タラ

和本草和名抄

マヒリクサ

和本草和名

キツ子ノサ、ゲ

カミナリサ、ゲ

越後同名梓

苦辛

和方書及藥店ニテ云ハ誤ナリ山海經ノ苦辛ハ別物也

原野水邊ニ

多シ春宿根ヨリ生ス葉ハ全ク槐ノ如シ故ニ三

才圖會ニ土槐ノ名アリ嫩苗紫色ヲ帶ブ夏月莖

ヲ抽テ三四尺梢ニ穂ヲ生ス又槐花ニ似タリ一  
花ハ赤小豆花ノ如ク白色淡黄紫色ノモノアリ  
後角ヲ結ブ又槐角ニ似テ細シ中子甚ダ馬蹄決  
明ニ似タリ根牛房ノ如キアリ外皮黒色内淡黄  
色味甚苦シ釋名ニ時珍云茶之部苦蕒ト同名ト  
云ヘ氏茶部ニ苦蕒ナシ濕草類ノ龍葵及敗醬又  
小酸漿等ニ苦蕒ノ名アレバコレヲ同名異物  
ト云フヲ書シ誤リタルナルベシ血痢不止苦參  
炒焦爲末丸梧子大每服二十米飲下

本草  
穿要

苦參

クラ、

本草和名

下濕ノ地ニ生ズ葉ハ槐ノ

如ク嫩苗紫色ヲ帶ブ莖高サ三四尺穗ヲ生ジテ

槐花ニ似タリ白色又淡黄紫色ノモノアリ後角

ヲ結ブ槐角ニ似テ細シ根牛房ノ如ク外皮黒色

肉淡黄味甚苦

本草圖譜

苦參

クラ、

本草和名

○カミナリサ、ゲ

越後

○キツ子ノ

リダサ

苦參

醫心方

○ヒリダサ

和名鈔

○キツ子ノ

サ、ゲ

苦參

本草藥名備

仙臺考和訓鈔

苦參

クラ、

葉小槐葉ニ似テ小ニ力也夏黄

白花穂ヲナスフヂノ花ノ形ノ如ク根甚苦シ煎

テ殺虫ニ用ユ蛇虫ニハ煎服ス陰蝨頭蝨ニハ煎

ノ數々アラウ立花ノ粉虫ヲ洗フニヨシ百花天工區別

苦參藻鹽草作苦辛 藥舖作苦辛 醫心方云麻士利久左和本名

麻士作麻比 新撰字鏡云久良良葉如槐葉花如豆

花數房連綴色白或淡黃今出武藏處澤本草綱目纂疏

クラ、クサエンジュ 北濃 苦參物品 識名

苦參根 クラ、 舶來ナシ 和産藥舖ニ多シ真ナリ


日用藥  
品考

苦參 白堊 苦骨 和方書二苦辛卜云  
手板發蒙

本草通串卷四十九



本草通串卷五十



富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

白鮮

白鮮味苦寒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

溫痺死肌不可屈伸起止行步

神農本草經大觀本草○

本草經曰白鮮治酒風

神農本草經太平御覽○

白鮮

音仙 經中品 本

**主治** 頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中

腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步

本神農本草綱目

白鮮味苦寒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛

濕痺死肌不可屈伸起止行步

神農本草經 盧復手錄

白藓皮味苦寒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫

痛溼痺死肌不可屈伸起止行步

神農本草經疏 吳懷祖輯要

白鮮味苦鹹無毒療四肢不安時行腹中大熱飲水

欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛生上谷川谷及

冤句四月五月採根陰乾

名醫別錄 大觀本草

集解別錄曰白鮮皮生上谷川谷及冤句四月五月  
采根陰乾氣味別錄曰鹹主治療四肢不安時行腹  
中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後餘痛別錄

名醫別錄  
本草綱目

鮮魚名出貉國从魚犇省聲相然切說文

陶隱居云近道處處有以蜀中者為良俗呼為白羊

鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶神農本草陶弘景  
註○大觀本草

釋名白羶弘景白羊鮮弘景曰俗呼為白羊鮮氣息

正似羊羶故又名白羶集解弘景曰近道處處有以

蜀中者為良

神農本草陶弘景註○本草綱目

惡蠟蛸桔梗茯苓薔薇

藥對○大觀本草

氣味

惡蠟蛸桔梗茯苓薔薇

藥對○本草綱目

藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風風瘡疥癬

赤爛眉脫脆皮飢急壯熱惡寒主解熱黃酒黃急黃

穀黃勞黃等良

藥性論○大觀本草

主治治一切熱毒風惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆

皮肌急壯熱惡寒解熱黃酒黃急黃穀黃勞黃

甄權性

論○本草綱目

白蘚味苦鹹寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰  
中腫痛濕痺死肌不可屈伸起止行步療四肢不安  
時行腹中大熱飲水欲走大呼小兒驚癇婦人產後  
餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根陰乾千金翼方  
唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白而心實  
花紫白色根宜二月採若四月五月採便虛惡也唐本

注○大  
觀本草

集解恭曰其葉似茱萸高尺餘根皮白而心實花紫  
白色根宜二月採若四月五月採便虛惡矣唐本注  
○本草



綱目

白鮮楊玄探音私延反一名羊鮮一名白羶陶景注云氣息正似羊羶

和名比都之久佐本草和名

上總國廿種 白鮮六斤○下總國三十六種 白

鮮五斤延喜式

鮮魚也出貉國從魚犇省聲臣鍇曰古以此字音勘

借為眇少今人用為魚息衍反說文解字通釋

白鮮 陶隱居本草注云白鮮一名羊羶和名比豆之佐式

連反羊 氣似羊羶故以名之和名類聚抄

臭也

日華子云通關節利九竅及血脉并一切風痺筋骨  
弱乏通小腸水氣天行時疾頭痛眼疼根皮良花功  
用同上亦可作菜食又名金雀兒椒

日華本草  
大觀本草

釋名金雀兒椒

日華

主治

通關節利九竅及血脉通小

腸水氣天行時疾頭痛眼疼其花同功

大日華子大  
明○本草

綱目

圖經曰白鮮生上谷川谷及冤句今河中江寧府潞  
州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似菜  
萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而

心實四月五月採根陰乾用又云宜二月採差晚則  
虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼爲白羊鮮又名地  
羊羶又名金雀兒椒其苗山人以爲萊茹葛洪治鼠  
痿已破出膿血者白鮮皮煮汁服一斗當吐鼠子乃  
愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮皮湯方甚妙○圖經大  
草觀本

釋名地羊鮮

經圖

集解

頌曰今河中江寧府滁州潤州

皆有之苗高尺餘莖青葉稍白如槐亦似萊萸四月  
開花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓菁皮黃白而心

寶山人采嫩苗爲菜茹 主治治肺嗽

蘇頌本草綱目經

滁州白鮮 四月五月採根陰乾○江寧府白鮮備急

本草圖按

白蘚皮味苦鹹寒無毒除疽通淋主風癰手足不舉

調經水療陰痛 白蘚皮去風治筋弱而療足頑痺

李杲

藥性賦

白鮮 味苦鹹氣寒無毒山谷俱有苗莖尺餘

嫩可作茹

葉稍白似槐葉尤繁花淡紫

四月開

如蜀葵畧小根與

蔓菁彷彿心實皮色白黃二月採根取皮差晚則虛

惡也因輟作羊羶氣息故俗加羊字呼名

俗呼爲白羊鮮惡

桔梗蟬蛸及挨苓草薜療遍身黃疽濕痺手足不能屈伸治一切癩毒風瘡眉髮因而脫落消女人陰腫或產後餘疼止小兒驚癇併淋瀝效逆時熱發狂飲水多多煎服尤宜葛洪治鼠瘻有膿熬白鮮皮膏吐出生立愈李兵部理肺嗽不已製白鮮皮湯飲下卽差

本草蒙筌

白鮮皮味苦鹹性寒無毒入肺小腸一治主頭風黃疽咳逆淋瀝濕痺死肌一切疥癩惡風疥癬楊梅諸



瘡熱毒天行時疾頭痛眼疼女子陰痛小兒驚痢和  
血脉通九竅利小腸惡蠅蝥桔梗茯苓薤 按白  
薤皮入肺經故能去風入小腸故能去濕夫風濕既  
除則血氣自活而熱亦從此述矣

錫補雷公炮製藥性解

白鮮皮以蜀中者爲良根白色因襲作羊羶氣息故

加羊字呼名

味苦鹹性寒無毒主頭風黃疸欬逆淋瀝女子陰中腫痛濕痺死肌不可屈伸

起止行步癢四肢不安時行腹中大熱飲水欲走大  
呼小兒驚癇婦人產後餘痛一切疥癬惡風疥癬楊  
梅諸瘡 按白鮮皮入肺經故能去風入大小腸經  
熱毒 故能去濕夫風濕既除則血氣自活而熱  
亦從此 入藥 昔葛洪治鼠瘻已有口膿血出者  
述矣 用根 熬白鮮皮膏服之後吐鼠子而愈

白鮮

二六

本草  
原始

白鮮皮 白羊鮮 白羶 地羊鮮 地羊羶 金

雀兒椒 事物  
異名

白鮮 呂氏曰 性寒味苦鹹無毒治一切熱毒風

惡風風瘡疥癬赤爛眉髮脫皮肌急解熱黃酒黃急

黃穀黃勞黃主一切風痺筋骨弱乏不可屈伸○生

原野處處有之以其氣似羊羶故俗呼爲白羊鮮四

五月採根陰乾 本草東醫  
寶鑑

白鮮皮 氣寒善行味苦性燥 行水  
故燥 入脾胃除濕熱

兼入膀胱小腸行水道通關節利九竅爲諸黃風痺

之要藥

一咏白鮮皮湯治產後  
珍曰世醫止施之瘡科淺矣時兼治風瘡疥癬

女子陰中腫痛

濕熱衆虛客腎  
與膀胱所致

根黃白而心實取皮

用惡桑螵蛸桔梗茯苓

草增訂本  
備要

鮮蘇焉切音仙白鮮藥名葉似茱萸花紫白色根皮

白心實本草名白羶白羊羶又名金雀兒椒此草根

白作羊羶氣子累累如椒故兼諸名

正字  
通

白藓皮稟天地清燥陰寒之氣降多於升陰也入肺

脾胃大小腸經苦寒燥淫除熱之品爲諸黃風痺要

藥 得牛膝石斛薏苡仁黃蘗蒼朮療足弱頑痺去

下部溼熱加金銀花漢防已治下部一切溼瘡 惟

下部虛寒者雖有溼證勿用

本草經  
疏輯要

白羊羶 地羊鮮 金雀兒椒 正字通白鮮藥名

本草名白羊羶又名金雀兒椒此草根白作羊羶氣

子累累如椒故兼諸名又圖經名地羊鮮鮮卽羶也

事物異  
名錄

鮮 先清次蘇前切音仙

字彙

白鮮一名白羶一名金雀兒椒生上谷及江南苗高



尺餘莖青葉稍白似茱萸夏月開花淡紫色類小蜀

葵根如蔓青皮黃白而心實嫩苗可爲茱萸

秘傳花鏡

增本草綱目白鮮一名白羶一名白羊鮮一名地羊

鮮一名金雀兒椒

陶弘景曰俗呼爲白羊鮮氣急正似羊羶故又名白羶李時珍曰鮮

者羊之氣也此草根白色作羊羶氣其子累累如椒故有諸名陶弘景曰近道處處

有以蜀中者爲良蘇頌曰今河中江寧府滁州潤州

皆有之苗高尺餘莖青梢白如槐亦似茱萸四月開

花淡紫色似小蜀葵花根似小蔓青皮黃白而心實

山人永嫩苗爲茱萸氣味苦寒無毒治一切風熱瘡



癰時疾黃疽風痺欬逆小兒驚癇通關節利九竅及

血脈其花同功

廣羣芳譜

藥屬

白蘚

重修鎮江府志

藥之屬

有白鮮皮

氣息似羊羶或名羊羶俗名白羊鮮縣志

白鮮皮

氣息似羊羶或名白羶俗名白羊鮮

杭州府志

鮮

唐韻

集韻

韻會

並相然切音仙

康熙字典

白鮮花

葉青莖白已云羶入夏芳花碧紫妍顏臉

每興衰老嘆爭誇此卉獨名鮮

百花詩

白鮮

一名白羶莖青葉白似茱萸夏開花淡紫色

類小蜀葵

百花生詩註

白鮮

和名

比豆志久左

異名

白羶

弘景

白羊鮮

同

增

補異名

地羊鮮

經圖

金雀兒椒

日華

多識編

白鮮皮苦寒去粗皮惡蟬蛸桔梗茯苓蘼蘼○白鮮

花艷可愛世多無有知者市人乃剝木槿及木芙蓉

花根皮以假偽宜審之

本草喉襟

白鮮皮

白羶

白羊鮮

金雀兒椒

地羊鮮

和名比豆之久佐 水綱白鮮其苗高尺餘莖青葉

稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵花

根似小蔓著皮黃白而心實其氣似羊羶氣鮮者羊之氣也

故名之其子累累如椒山人采嫩苗爲菜茹采根皮

爲藥氣味苦寒性燥善行足太陰陽明經去濕熱藥也

兼入手太陰陽明爲諸黃風痺要藥世醫止施之瘡

科淺矣惡蟪蛄梗△按白鮮皮往昔出於本朝也

茯苓革蘚

今亦丹波及吉野山中有之高三四尺葉似水椹而

小六七月開單白花亦似水椹而小根亦似水椹而

黃白色俗呼曰寒牟須伊山人伐之爲柴薪卽水類

也其根以充白鮮皮然和漢大異而葉花亦不相似

唐白鮮皮形似筆管而細倭者如椒木皮而濶故官

今禁止賣買

倭漢三才圖會

白鮮

一名白羊鮮

補註本草

一名白羶

同上

一名金

雀兒椒

同上

一名地羊羶

圖經本草

白鮮味苦鹹寒無

毒療四肢不安時行腹中大熱飲水欲走小兒驚癇

婦人產後餘痛生上谷川谷及冤句四月五月採根

陰乾

梁陶弘景名醫別錄

陶隱居云近道處處有以蜀中者

爲良俗呼爲白羊鮮音仙氣息正似羊羶或名白羶

唐本注云此藥葉似茱萸苗高尺餘根皮白心實花

紫白色根宜二月採若四月五月採便虛惡也臣禹

錫等謹按藥性論云白鮮皮臣治一切熱毒風惡風

風瘡疥癬赤爛眉髮脫脆皮飢急壯熱惡寒主解熱

黃酒黃急黃穀黃勞黃等良日華子云通關節利九

竅及血脉并一切風痺筋骨弱乏通小腸水氣天行

時疾頭痛眼疼根皮良花功用同上亦可作菜食又

名金雀兒椒嘉祐補注本草白鮮生上谷川谷及冤句今

河中江寧府滁州潤州亦有之苗高尺餘莖青葉稍

白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色似小蜀葵根似



蔓菁皮黃白而心實四月五月採根陰乾用又云宜  
二月採差晚則虛惡也其氣息都似羊羶故俗呼爲  
白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒椒其苗山人以爲  
萊茹葛洪治鼠瘻已自口膿血出者白鮮皮黃汁服  
一升當吐鼠子乃愈李兵部手集方療肺嗽有白鮮  
皮湯方甚妙

宋蘇頌圖  
經本草

白鮮山谷具有苗莖尺餘

嫩可  
作茹

葉稍白似槐葉尤繁花淡紫

四月  
開

如蜀葵略小

根與蔓菁彷彿心實皮色白黃二月採根皮差晚則  
虛惡也因輟作羊羶氣息故俗加羊字呼名俗呼爲  
白羊鮮

○明陳嘉謨  
本草蒙筌

鮮者羊之氣也此草根白色作羊羶

氣其子累累如椒故有諸名

明李時珍  
本草綱目

白蘚皮味

苦鹹氣寒無毒山谷俱有苗莖尺餘葉稍白似槐葉

尤繁花淡紫如蜀葵略小根似蔓菁心實皮白二月

永取根艱作羊羶息

清何培元本草  
綱目類纂必讀

白鮮生上谷

川谷及冤句今河中江寧府滁州潤州皆有之苗高

尺餘莖青葉稍白如槐亦似茱萸四月開花淡紫色

似小蜀葵根似蔓菁皮黃白而心實四月五月採根

陰乾用又云宜二月採差晚則虛惡也其氣息都似

羊羶故俗呼爲白羊鮮又名地羊羶又名金雀兒椒  
其苗山人以爲菜味苦寒無毒主頭風黃疸眼痛一  
切熱毒風風瘡疥癬婦人產後餘血

明王思義增補  
三才圖會庶物

類纂

白鮮皮釋名中立曰根白色因艱作羶氣息故加羊  
字呼名又名白羊鮮修治水洗去粗皮剉用和俗有

用槿皮者大誤也可用中華產也氣味苦寒無毒能

主風癰手足不舉筋骨弱乏濕痺死肌不可屈伸一  
切熱毒惡瘡風癬眉髮脫落通小腸水氣故淋瀝黃

疽用之兼療女子陰中腫痛小兒驚癇毒惡蠅蝟枯

梗茯苓革薢修治本書ノ如シ和藥ナシ唐ヲ用ベ

シ日本ニモアレ<sup>レ</sup>珍花ナルヨシ稻先生秘メ不

傳カ澤山ニアルモノナレバ知ラデモ不<sup>レ</sup>苦<sup>カラ</sup>遠キ

藥也巽齋云和產花シノブト云未詳モノナリ能

此藥必竟風濕熱ヲ去ル藥ト意得ベシ遠キ藥ナ

レバ古方ニ組合セテアルニマカセテ可用搜風

解毒湯ニ用テ楊梅瘡濕熱遺毒ヲ治ス餘程ツヨ

キ藥トミユル一切熱毒惡瘡風癰コレ圈点ナリ

片玉六  
八本草

白鮮皮 漢真ナリ和未詳木槿根皮ヲ充ルハ非

也又コマツナギト云艸アリ其根ヲ用ユルアリ

又花シノブ艸ト云説アリ未知<sub>レ</sub>的否<sub>一</sub>○白羊鮮

千金方ニ出ツ卽チ前編ノ白鮮皮ナリ○白癬皮

白鮮皮ナリ 用藥  
須知

白鮮 ムクダノ皮ヲ以テ偽ル唐ヨリ出ルヲ使

フベシ和ニコマツナギト云フモノ是ニ似タレ

皮未分明<sub>多</sub>真ノ白鮮ハ葉ハギノゴトクニテ根白



ク腥シト云フ コマツナギハ根ニクサミナシ  
故ニ真ニアラズ實ハ川椒ノ實ノゴトクナリト  
云ヘリ 會誌云永祥原始ニ圖アリ別本ニ云渡  
ノモノ真ナリ藥店ニアルモノ和産ハイツワリ  
モノナリコマツナギヲ充ハ誤ナリ一種小草ニ  
ノ葉有似楊柳者ト云白鮮根ナマダサキ物アツ  
ベシ又和ニナシ 集解ノ小蜀葵 ゼニアライ

本草  
會誌

○照任曰相州子安ト云處ヨリ白鮮皮ヲ出ス

先生按ズルニ中華ヨリ來ル用ユベシ今コマツ  
ナギト云フ草ヲ用ヒ或ハ花シノブトイフ草ヲ  
白蘚皮ニ當ル何レモ根ニ腥氣アリテ分明ナラ  
ズ使記 抹藥

白鮮 ヒツジダサ和名〔一名〕檢花根村家 漢渡

ノモノ真物ナリ用ユベシ古渡ハ心ナク皮ノミ  
ニノ色白シ新渡ハ心ヲ去ズ全根ナリ形長大ニ  
ノ色ニウルミアリ和産ハ未ダ詳ナラズ今漢種  
ノ白鮮ト呼者二品アリ其一ハ葉小クサセウ椒葉ノ如

シ其一ハ葉大ニノ野薔薇ノイバラ葉ノ如シ寛政午年ニ  
 來ル白鮮皮中ニ苗葉ヲ連ヌル者アリ其葉今裁  
 ルトコロノ大葉ノ者ニ異ナラズ根味モ同ジケ  
 レバ此品真ナルベシ古説ニハナシノブ一  
 名クサシノブハルグワツカウト云草ヲ充レ  
 ば穂ナラズ其草ハ種樹家ニ多ク栽春宿根ヨリ  
 生ズ苗ノ高サ二三尺葉ハ崖椒イサシモウ又皂莢サイカチノ葉ニ似  
 タリ四五月葉端ニ五寸許ノ穂ヲナス花ノ形桔  
 梗ニ似テ五瓣大サ三四分色紫碧又白花モアリ

實ハ房ヲナス南天燭子ヨリ小シ熟ノ褐色此根

ハ甚細ク用ルニ耐ズ今一種大葉ノモノアリ花

モ大ナリ俱ニ真ニ非ズ又 コマツナギヲ以テ

本條ニ充ルモ亦非ナリ コマツナギハ救荒本

草ノ馬棘ナリ

本草綱目啓蒙

金雀兒椒ハナシノブ

春苗ヲ發ス稜莖直

上ス高サ二三尺ソノ葉漢椒サシタウニ類シテ尖峭ナリ

又走葉水葉サイカチニ似テヤ、柔軟ニシテ淺綠色ナリ

四五月莖梢ニ花ヲ開ク淡紫碧色或ハ白色大サ

三四分ニシテ五出形ヲ苦梗キ、ヤウ花ニ類シテ小ナリ

攢薇アツニルシテ總ヲ成ス花謝シテ房ヲ結ブ圓ニシテ

女青實ヘウカクノミニ似タリ肉ニ細子アリ花景

白鮮花ハナシノブ○葉稍白似茱萸廣ク山椒類

秘傳花  
鏡澤說

花忍ハナシム葉草フチニ似タリ花ノシノ立ハ八代草ヤシシロサウ

ニ似テノビ花ノカタチ桔梗ノゴトク色ウスム

ラサキ又白モアリタケ二三尺バカリ花五月中

旬ニアリ繪本野

山草



白鮮皮 白羊鮮 ヒツジクサ 唐真和偽多シ

藥品手  
引草

白鮮 一名白羊鮮イロハシ即チ白鮮皮ナリ 和名ヒツジ

クサ訓古 一名カンスイ根白ク氣鮮腥ナリ丹波

及ビ大和芳野山中ニ生ズ木槿ニ似テ秋單瓣ノ

白花ヲ開ク又紫花ノ者アリ先君子曰花シノブ

ニ充レ氏花シノブハ根腥カラズ花シノブ秋紫

花ヲ開ク又曰ヤナギサウ白鮮ニ近シト云千金方藥

註

白鮮皮 漢渡真ナリ松岡氏云和方水槿根皮ヲ  
用ユ非ナリ又花シノブト云説アリト愚按花シ  
ノブハ花葉實ノ形狀ハ本草ノ説ニ髣髴タリ其  
根細鬚ノミ漢渡ハ根ノ形小蘿蔔ニ似タリ然バ  
此説誤ナリ本草  
正譌

白鮮經本 按別錄曰四月五月採根陰乾無用皮之

說圖經曰宜二月採差晚則虛惡也本草蒙筌作二  
月採根取皮差晚則虛惡也圖經無取皮二字日華  
子曰根皮良花功用同藥性論作白鮮皮古方書或

有無皮者今按本經別錄用其根東璧補皮字恐誤  
矣取根皮用之者藥性論日華子之說而白鮮皮之  
號出於後世可知也

本草  
鉤衡

白鮮

和名ヒツジクサ

本草和名今  
何物哉不詳

蠻名ジヲ

タルニユスフロレアルボ

荷蘭

セイテハアル

ヤ 漢種ノ白鮮真物ナリ春宿根ヨリ生ズ葉ハ

呉茱萸ニ似テ小又竹葉椒ニ似テ大也一莖ニ七

葉對生シ圓莖ニ互生ス夏月梢ニ穗ヲ生シテ花

アリ萱草花ニ似テ小白色ニシテ紫紅ヲ帶ブ後

芡ヲ結ブ五稜アリテ形八角茴香ニ似テ大ナリ  
中ニ小黑子アリ椒目ノ如シ地ニ下シテ生ズ莖  
葉及芡ニ香アリ蜀椒ノ香ニ似タリ根白色大母  
指ノ大サ皮ノ質羊皮ニ似タリ釋名氣羊ノ如シ  
ト云ハ不穩根皮ニ似タルノ意ナルベシ又金雀  
ハ花ノ形兒椒ハ香氣及子ノ形ヲ云ナリ然ルヲ  
尾州ノ方言ムレスミト云小水ヲ以テ金雀兒  
椒ニ充ツルハ甚誤ナリムレスミハ救荒本草  
ノ壩齒花一名金雞兒ナリ又古説白鮮ニ和名ハ

ナシノブ一名ハルダハツカウト云草ヲ充ルハ  
非ナリコレハ槐葉王不留行ノ類ナリ又コマツ  
ナギヲ充ルモ非ナリコレハ救荒本草ノ馬棘ナ  
リ本草  
穿要

白鮮 漢種ノ物真物ナリ宿根ヨリ生ズ葉ハ異  
茶萸ニ似テ小ク竹葉椒ニ似テ大ナリ花ハ莖草  
花ニ似テ小ク白色マシテ紅紫ヲ帶ブ莢ハ五稜  
アリテ形チ八角茴香ニ似テ大ナリ中ニ小黑子  
アリ椒目ノ如ク葉莖ミナ山椒ノ香ヒアリ故ニ



ニノ莖頭花穂ヲ生ス藤ノ花ノ如ニノ小也淡紅

白二色アリ

金雀兒椒ト云アリ莖二三尺葉狹

ク小ニノ三尖刺アリ春莖上エニシダノ如花黃

花ヲ生ス共ニ白鮮ノ名アリ  
百花天  
工區別

白鮮 綱目 一名白羶 同上 白羊鮮 同上 地羊鮮 圖經

金雀兒椒 日華 和名 草シノブ ハルダワツカ

ウ 宿根ヨリ苗ヲ生ス高サ二三尺ニ至ル葉ハ

大山椒ニ似タリ又サイカイシヤ土用フヂノ葉

ニモ似タリ葉カズ多クツキテ互生ナリ莖ノ末

ニ穗ヲ生シ花ヲヒラク桔梗ノ花ニ似タリ色モ  
相似テ五ベン大サ四五分バカリ又白色モ有リ  
花ノアトニ丸キ實ヲ生ズ南テンノ實ヨリ小ナ  
リ熟シテ色黒シ

四季賞  
花集

白鮮 和産絶無漢渡常有宜揀取新鮮氣味苦寒  
者今 官園所養漢種葉似山茱豆夏開五瓣白花  
花罷結實狀如椒目稍大揉其莖葉嗅之微爲羊羶  
之氣其根不似舶渡物繁嘗視中山人齎來四川種  
其狀似迎春探春之倫一枝四葉宛然類椒葉秋開

黃花與金雀花無別前在藩府偶製其根試之與吳  
舶載來者無別然本草言花淡紫色深疑之故復將  
此草葉腊詐爲斯方產隱其名問舶估凡兩三次僉  
言白鮮中國四川者勝閩省所產亦此類也因意日  
華子所云金雀兒椒之名相當矣

金雀似謂其花  
兒椒似謂其葉近

京人於白鮮櫃中得枯葉數枚其狀正與所謂四川  
種同已未之秋京師醫士小石玄俊言此亦一證也

本草綱目纂疏

增一名白羊羶

正字通

增文化年間以來花戶二唐種

ノ白鮮一名金雀兒椒ト呼者アリ水本ニノ一株  
數條ヲ生ス大抵伏牛花ノ輩ニ似テ高サ四五尺  
ニモ至ル春月新葉莖ニ互生ス四葉排生ノ一葉  
トナル一葉ノ形水蠟樹葉ニ似テ深綠色ニノ微  
ク硬シ又迎春花ノ葉ニモ似タリ葉莖ノ本ニ兩  
刺アリ四月葉間ニ花ヲ開ク赤小豆花ニ似テ黃  
赤色ナリ花謝シテ後小キ莢ヲ結ブ根ハ長ク皮  
厚クメ臭氣アリソノ金雀兒椒ハ白鮮ノ一名ナ  
レ凡白鮮ノ類ニハ非ズコレ救荒本草ノ蠟齒花

本草通串

ナリ

重修本草  
綱目啓蒙

ハクセン

通名

白鮮

物品  
藏名

白鮮皮

根皮

舶來多シ古渡ノモノハ根皮ナリ

新渡ノモノハ全根ナリ心ヲ去テ用ユベシ 和

産ナシ

漢種ヲ傳載ルモノア日用藥  
レ氏藥舗ニイデズ品考

白鮮皮

檢花根

白羊鮮

今漢種ノ白鮮ト云

モノハ大葉ノモノニノ野イバラ葉ノ如シ寛政

午年ニ渡ル所ノ白鮮皮中ニ苗葉ヲ連ルモノア

リ其葉異ナラズ又コマツナギト云草ヲ白鮮ニ



充ル古説アレ非ナリコマツナギハ救荒本草

ノ馬棘ナリ  
手板  
發蒙

本草通串卷五十

本草通串

白鮮

三十二

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

本草通串卷五十一

富山侍從兼長門守菅原朝臣利保纂輯

山草

延胡索

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者  
婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血  
衝上因損下血或酒磨及煮服生藥國根如半夏色

黃  
名醫別錄

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者  
婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血  
衝上因損下血或酒摩及煮服生美國根如半夏色

黃  
梁陶弘景名醫別錄  
○增補底物類纂

雷公云心痛欲死速覓延胡乃以玄胡索末三錢溫

酒調下  
炮炙論

延  
長行也从延ノ聲以然切  
艸有莖葉可作繩索

从水糸杜林說水亦朱水字蘇各切  
說文

延胡索生美國從安東來根如半夏色黃本草拾遺

集解藏器曰延胡索生美國從安東來根如半夏色

黃本草拾遺  
本草綱目○

巨烏錫等謹按日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖

撲損瘀血落胎及暴腰痛蜀本草掌禹錫  
按○大觀本草

海藻云生美國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破

產後惡露及兒枕與三棱鱉甲大黃爲散能散氣通

經絡蛙蚰成末者使之惟良偏主產後病也海藥  
○大

觀本  
草



氣味

珣曰苦甘

主治

散氣治腎氣通經絡

李珣

發明

珣

曰主腎氣及破產後惡露或兒枕與三稜鼈甲大黃

爲散甚良虫蛙成未者尤良

海藥本草  
本草綱目

○

延長行也從延一聲臣鑑曰安步然後知千里之行

也一音怡以然反

藻

草有莖葉可作繩索從水糸聲

杜林說水亦朱永字臣鑑曰水韋繩也麻芒蒲是皆

草爲繩索也思落反

說文解  
字通釋

延胡索味辛溫無毒主破血產後諸病因血所爲者  
婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血運暴血

銜上因損下血或酒摩及煮服生臭國根如半夏色

黃

開寶本草○  
大觀本草

主治破血婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後

諸血病血運暴血銜上因損下血煮酒或酒磨服

實開

開寶本草○  
本草綱目

延胡索味辛溫無毒主破血婦人月經不調腹中結

塊崩中淋露產後諸血病血暈暴血銜上因損下血

開寶本草○  
吳懷祖輯要

日華子云除風治氣暖腰膝破癥癖撲損瘀血落胎

及暴腰痛

日華本草  
大觀本草○

除風治氣腫腰膝止暴腰痛破癰瘰癧損瘀血落胎

大日華子大明  
○本草綱目

延胡索象云破血治氣月水不調小腹痛煖腰膝破

癰瘰癧碎用

藥類法象  
湯液本草○

氣味

甘辛溫可升可降陰中陽也  
藥類法象  
本草綱目○

延胡索

氣溫

味辛

苦辛溫無毒

入手足太

陰經

○液云治心氣痛小腹痛有神主破血產後

諸疾因血爲病者婦人月水不調腹中結塊崩漏淋

露暴血上行因損下血

湯液本草

釋名

好古曰本名玄胡索避宋真宗諱改玄爲延也

氣味

好古曰苦辛溫純陽浮也入手足太陰經主治

治心氣小腹痛有神

好古王好古古本草綱目

主心氣小腹痛

王好古○吳懷祖輯要

調血須用玄胡索○玄胡索可截腹心疼○玄胡索

味辛溫無毒治女人月水不下行腎氣○玄胡索味

苦辛性溫無毒可升可降陰中之陽也其用有二活

精血能療產後之疾調月水主胎前之症

藥性賦

滴金卵

延胡  
輟耕錄

玄胡索味苦辛性溫無毒入心肺脾胃四經活精血

療產後之疾調月水主胎前之症一切因血作痛之

症並治酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血○

按玄胡索可升可降爲陰中之陽故能行上下四經

此理血之劑也苟非血症用之無益

藥性  
解

玄胡索味苦辛氣溫無毒可升可降陰中陽也入

手足太陰厥陰經行血中氣滯氣中血滯之藥

李時珍  
先

生曰生東北夷方今二茅山上龍洞及仁和菟橋亦種之寒露後栽種立春後生苗高三四寸延蔓布地



葉必三之宛如竹葉片片成個細小嫩綠邊色微紅  
作花黃色亦有紫色者根叢生蔓延結如芋粒亦如  
半夏但色黃耳立夏後掘取洗淨酒浸

○玄胡索通

蒸晒乾得蟲蛀末尤良治血化氣第一  
經絡行血中氣滯氣中血滯之藥也凡治男婦長幼  
一身上下諸因氣滯血滯爲病者然于婦人爲尤宜  
故病血氣積聚腹中結塊癥瘕脹滿或崩中淋瀝漏  
下不止或惡露攻衝惡心眩暈是皆婦人血分之病  
也又于男子可治之證疝核痛暴腰痛心胃卒痛小  
腹脹痛是皆厥陰氣分之病也俱以此藥治之凡用  
之行血酒制則行用之止血醋制則止用之破血非

生用不可用之調血非炒用不神隨病制宜應用無窮者也但性味溫辛能走而不能守故經事先期與一切血熱或崩中淋露應用補氣血涼血清熱藥者一切辛走之藥法所必禁○繆仲淳先生曰玄胡索稟初夏之氣而兼得乎金之辛味故辛溫則能和暢和暢則氣行辛溫則能潤而走散走散則血活血活行故能主破血及產後諸病因血所爲者婦人月經之所以不調者無他皆氣血不和因而凝滯則不能以時至而多後期之證也腹中結塊產後之血暈暴

血衝上因損下血等證皆須氣血和而後愈故悉主之也崩中淋露利守不利走此則非與補氣血藥同用未見其可○盧不達先生曰曰名玄而色黃醜金氣也氣溫而味辛秉金性也以一春而備四氣葉必三之具水生數象形對待肝血之非其所藏而玄爲破堅之線索無疑矣以言疾疢之證因以主治之力判屬血中之氣藥氣中之用藥也蓋氣主噓之血主濡之氣之所不噓卽血之所不濡矣如腹中結塊膜絡癥瘕之爲證卽血留營實之爲因如腫腹氣塊

盤繞之爲證卽氣滯衛實之爲因如崩中淋露運血  
衝暴之爲證卽血菀營泣之爲因如奔豚逆厥百體  
疼煩之爲證卽氣弛衛薄之爲因玄胡索立鼓血中  
之氣震行氣中之用虛則補實則平推陳致新之良  
物也○茹永之先生曰幽深遽遠曰玄遶旬荒服曰  
胡索取而竭之也此指玄胡索之功用行瘀血沽滯  
血推死血凡人身藏府膜原絡谷隧道偏僻幽隱之  
處一切行血藥之所不及至者玄胡索取而竭之無  
餘留矣命名者以此也夫○廣濟方治產後血暈用

玄胡索當歸生地牛膝川芎甘草童便○聖惠方治  
產後諸病凡產後穢汚不盡腹滿及產後血暈心頭  
鯁悶或寒熱氣力欲絕者用玄胡索酒炒研末酒服  
二錢○直指方治疝氣危急用玄胡索鹽水炒全蝎  
生用各等分研末空心鹽酒下○又方治冷氣腰痛  
用玄胡索當歸肉桂各等分研末溫酒服三四錢隨  
量頻進以愈爲度○又方治熱厥心痛或發或止久  
不愈身熱足寒者用玄胡索金鈴子肉各等分爲末  
白湯下二錢○濟生方治婦人腹中刺痛經候不調



用玄胡索醋炒當歸酒炒各一兩香附醋炒一兩五錢共爲末神麴醋打糊爲丸梧桐子大每服百丸空心白湯下○治下痢腹痛用玄胡索醋炒爲末米飲調服三錢○治小兒盤腸氣痛用玄胡索醋炒大茴香炒各等分爲末大人三錢小兒一錢白湯調服○治墮落車馬跌蹠筋骨痛不止用玄胡索爲末生酒調服三錢○續補集方治男婦血氣積聚腹中結塊癥瘕脹滿或崩中淋瀝漏下不止或穢露攻衝惡心眩暈用玄胡索四兩醋浸炒當歸身川芎各一兩五

錢酒洗炒香附三兩童便浸炒炮薑灰牡丹皮焙各  
二兩共爲末水發爲丸梧子大每早服三錢白湯下  
○治婦人女子經血不調爲一切腹內脹滿痛滯諸  
疾用玄胡索醋炒益母葉酒炒香附末童便浸炒當  
歸川芎俱酒炒各二兩共爲末煉蜜丸如梧子大每  
早晚各食前服三錢白湯下裏寒大便秘者加肉  
桂木香白朮各一兩元本虛弱者加人參黃耆各一

兩  
本草  
彙言

玄胡索生胡國玄言其色也索言其苗交紐也  
味辛  
溫無

毒主破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒磨及煮服○產後穢污不盡腹本草  
滿玄胡索末和酒服一錢立止  
原始

釋名玄胡索集解時珍曰奚乃東北夷也今三茅山

西上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹

葉樣三月長三寸高根叢生如芋卵樣立夏掘起氣

味辛溫無毒主治活血利氣止痛通小便時珍發明時

珍曰玄胡索味苦微辛氣溫入手足太陰厥陰四經

能行血中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛用

之中的妙不可言 荆穆王妃胡氏因食蕎麥麪著

怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯諸藥皆入口卽吐不能奏功大便三日不通因思雷公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以玄胡索末三錢溫酒調下卽納入少頃大便秘行而痛遂止又華老年五十餘病下痢腹痛垂死已備棺木予用此藥三錢米飲服之痛卽減十之五調理而安按方勺泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云腳氣藥悉不効周離亨言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂心等分爲末溫酒服三四錢

隨量頻進以止爲度遂痛止蓋玄胡索能活血化氣  
第一品藥也其後趙待制震因導引失節肢體拘攣

亦用此數服而愈

本草綱目

延胡索卽玄胡索味辛苦氣溫無毒來自安東縣名屬南直隸生

從奚國因避宋諱改玄爲延形類半夏色黃用須炒

過咀片專入太陰脾肺一云又走肝經調月水氣滯

血凝止產後血衝血暈跌撲下血淋露崩中小服卒

疼小腹脹痛並治之而卽効也

本草蒙筌

延胡索味辛苦氣溫無毒入肺脾二經又入肝定厥



陰調月水氣滯血凝止產後血冲血暈跌損橫傷下  
血崩淋心腹卒痛小腹脹疼皆能主治乃氣血中佐  
使之品可偶用見長者也產後又宜少用非用之于  
補氣補血中之內使可肆然多用耳○或問延胡索  
乃婦人所宜用而子曰宜慎用者何也延胡索破氣  
破血之藥也無氣之滯無血之瘀用之能安然無恙  
乎用之于補血補氣之內補血而不能救其破血之  
傷補氣而不能救其破氣之損况全無補劑其傷損  
之大更何如哉

本草  
新編

玄胡索

性溫味辛

苦 一云

無毒主產後諸病因血所

爲者治月經不調腹中結塊崩中淋露產後血暈消

撲損瘀血落胎破癥癖破血治氣治心痛小腹痛如

神○在處有之根如半夏色黃

本草

○入手足太陰

足厥陰經醋煮用之

入門

東醫寶鑑

延胡索 葉似竹葉根似半夏茅山龍洞杭州笕橋

種之入手足太陰厥陰能行血中氣滯氣中血滯乃

活血化氣第一品也崇禎丁丑老父爲南京壘鄉時

宴集散疑鯁鮎腹悶誤服香油遂痛而嘔醫家以爲

陰病服藥不效因而下閉一醫以萬應丸三服而不下迷急幾死金申之來視之此藥禍也當服黃連延胡索諸醫曰服涼藥則不救智卜於天服申之藥而愈其方乃黃連延胡索各三錢甘草一錢而已蓋藥毒結於腹巴豆猛於上膈得黃連瀉胸中而延胡索通血滯故解耳當腹悶時藿香正氣散卽無事矣以智于是學醫北齊李元忠隋許道幼唐王勃王壽永高若訥皆因親病通醫書人子須知不可不勉物理識延胡索 辛苦而溫入手足太陰脾肺厥陰肝心包經能

行血中氣滯氣中血滯通小便除風痺治氣凝血結

上下□外諸痛

通則不痛

藏癖崩淋月候不調

氣血不和因而凝滯

不以產後血運暴血上衝打傷積血疝氣危急爲活

血利氣第一藥然辛溫走而不守

獨用力迅宜兼補氣血藥

通經

墮胎血熱氣虛□禁用

根如半夏肉黃小而堅者

良酒炒行血醋炒止血生用破血炒用調血

本草備要

延胡索稟初夏之氣兼金之辛味可升可降陰中陽

也入手足厥陰太陰四經溫能和暢則氣行辛能走

散則血活氣行血活故能主產後因血所爲諸病

君當歸生地牛膝益母草童便主產後血暈有神

得四物湯鹿角膠牛膝香附主婦人經阻小腹作痛

或結塊 單用爲末猪胰一具切作塊子炙熟醮末

頻食治膜外氣疼及氣塊 同金鈴子肉等分爲末

溫酒或滾湯下二錢治熱厥心痛或發或止久不愈

身熱足寒者 凡經事先期及一切血熱爲病忌之

若崩中淋露皆應補氣血涼血清熱則愈一切辛走

之藥法所當禁

本草經  
疏輯要

延 依然切音筵

索蘇各切桑入聲繩索按說文艸有



莖葉可爲繩索从水糸正譌麻芒蒲皆艸也从水會  
音中象形本作索篆作𦉰水字兩旁二画不與一連  
與水別雖云據篆不詳篆形義改从水作索非  
滴金卵 清異錄候寧極藥譜滴金卵延胡索正字通  
錄事物異名

延仙清濁夷然切音沿長也索麥清次昔各切桑入  
聲繩索○按篆文宜作𦉰然今悉作索而不知索矣  
字

增本草綱目延胡索一名元胡索陳藏器曰延胡索

生美國從安東來根如半夏李時珍曰今二茅山西  
上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉  
樣三月長三寸高根叢生如芋卵樣立夏掘起氣味  
辛溫無毒治婦人諸血病除風治氣暖腰膝破癰癤  
撲損瘀血專治一身上下諸痛用之中的妙不可言

莖能活血化氣第一品藥也

廣羣芳譜

延胡索卽玄胡索也□曰今茅山上龍洞仁和寬橋  
亦種之寒露前栽種立春後生苗高三四寸延蔓布  
地葉必三之如竹葉時序成個細小嫩綠邊色微紅

作花黃色亦有紫色者根叢生蔓延狀似半夏但黃

色耳立夏掘起陰乾者良

本草述

延胡索 氣血能扶第一功春呈黃色又輕紅栽花

雖說多名種似此誰將雜砌中

百花詩

延胡索 出金壇溪陵澗者佳

重修江府志

延唐韻以然切集韻韻會正韻夷然切茲音延說文

長行也索廣韻蘇各切集韻韻會皆各切竺音祿說

文作索草有莖葉可作繩索从糸○按說文在水

部今併附入

康熙字典

延胡索和名

世牟布セムフ異名玄胡索

多識編

延胡索氣味辛溫無毒一云甘辛異名玄胡索モト

ハ玄胡索ト云索ノ真宗皇帝ノ諱ナル故ニ玄ヲ

改テ延トシタル也和名世無布セムフ修治其マ、劉三

少シ焙用ユ能手足太陰脾肺手足ノ厥陰心包ノ經

ニ入ル血ヲ活シ氣ヲ利シ心氣腹痛ヲ止メ小便

ヲ通シ諸ノ血病ニ用ユ○延胡索三稜龍甲大黃

等分末メ産後兒枕シラヲ治ス○血中ノ滯氣氣中ノ

滯血ヲ行ス故ニ一身ノ諸痛ニ上下三ナ用テ神

効アリ○或人蕎麥麴ヲ食シ怒コト有テ胃脘心  
ニ當リテ大ニ痛ム吐下行氣化滯消食ノ藥ミナ  
受ズヲ吐大便三日通ゼズ延胡索ノ末三錢溫酒  
調下スニ吐ズ少頃ノ大便通ノ痛ミ止○下痢腹  
痛百病効ナシ死セントスルニ米飲ニテ三錢ヲ  
服ノ痛ミ半分減ジ調理ノ愈○氣血凝滯ノ一身  
痛ムモノ中濕脚氣痛風ノ藥ニテ効ナキ者玄胡  
索當歸桂心等分末ヲ溫酒ニテ三四錢ヲ服シ猶  
シキリニ進テ痛遂止○熱厥ノ心痛起サノアル



者兼テ小兒ノ小便通ゼザルニ延胡索川練子ト  
等分末トナシ白湯或ハ酒ニテ下ス○産後ノ諸  
病血運心頭硬ク寒熱腹痛手足熱スルニ延胡索  
少末ノ酒服ノ神効アリ

毒腹中氣血弱ニハ忌

性藥

能毒

延胡索苦甘辛溫如半夏色黃上部酒炒中部醋炒

下部鹽水炒

本草  
喉襟

延胡索 玄胡索 本名避宋真宗諱改玄爲延 水網

延胡索本出奚國東北今二茅山西種之每年寒露

後栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢  
生如芋卵樣又如半夏而色黃立夏掘起

**氣味**

辛苦微溫

可升可降陰中陽入手足太陰厥陰四經能行血  
中氣滯氣中血滯故專治一身上下諸痛通小便

和漢

三才  
圖會

延胡索 和名 ボタニカラクサ 初春葉ヲ出ス  
高サ二三寸ヨク牡丹ノ葉ニ似テ尤小ナルノミ  
三月花ヲヒラクヤブケマンノ花ニ相同ジ又白  
花モヤ、アリ後子莢ヲ結ブ是モ藪ケマンノ莢

二同ジ内ニ子アリ黒ク光アリ根ハ半夏ノ如シ

黃色ニシ堅シ舶來ト相同ジ

本草花  
蒔繪

延胡索釋名時珍曰本名玄胡索避宋真宗諱改玄

爲延也李挺曰生胡國玄言其色索言其苗交紐也

修治其儘剉微炒用氣味辛溫無毒能入心肺脾胃

四經破血下氣調經利產止腹痛心疼血暈崩淋毒

虛人須與參朮同行不爾損真能本書ノ如シ活血

散血破滯止痛之藥ナリ五靈脂ト同用ノ胸痛心

痛欲死ヲ治ス此胃脘ノ氣血滯リテ痛ヲナス故

子リ○當歸芍藥ト同用ノ腹中血虛ノ痛ヲ治ス

○經水不調或產後ノ血痛ニ用テ能効アリ毒本

書ノ如シ非血滯者勿用片玉六  
八本草

延胡索 一名玄胡索本草綱目延胡索味辛溫無毒主

破血產後諸病因血所爲者婦人月經不調腹中結

塊崩中淋露產後血暈暴血衝上因損下血或酒磨

及煮服生奚國根如半夏色黃梁陶弘景  
名醫別錄海藥云生

奚國從安東道來味苦甘無毒主腎氣破產後惡露

及兒枕與三稜鼈甲大黃爲散能散氣通經絡蛙蚬

或求者使之惟良偏主產後病也

宋唐慎微證類本草

好古曰

本名玄胡索避宋真宗諱改玄爲延也

明李時珍本草綱目

乃東北夷也今二茅山西上龍洞種之每年寒露後

栽立春後生苗葉如竹葉樣三月長三寸高根叢生

如芋卵樣立夏掘起

同

荆穆王妃胡氏因食蕎麥麪

著怒遂病胃脘當心痛不可忍醫用吐下行氣化滯

諸藥皆入口卽吐不能奏功大便不通三日因思雷

公炮炙論云心痛欲死速覓延胡乃以玄胡索末三

錢溫酒調下卽納入少頃大便秘行而痛遂止又華老



年五十余病下痢腹痛垂死已備棺水予用此藥三錢米飲服之痛卽減十之五調理而安按方勻泊宅編云一人病遍體作痛殆不可忍都下醫或云中風或云中濕或云脚氣藥悉不効周離亨言是氣血凝滯所致用玄胡索當歸桂心等分爲末溫服三四錢隨量頻進以止爲度遂痛止益玄胡索能活血化氣第一品藥也其後趙待制震因導引失節肢體拘攣亦用此數服而愈

同上

玄胡索今出茅山西上龍洞種之每年寒露後栽立春後生苗葉如竹葉高三寸許

根叢生如半夏色黃立夏掘取始生胡地玄言其色

也索言其苗交紐也後避宋真宗諱改玄爲延也今

呼爲延胡索氣味溫無毒

明李中立本草原始

延胡索卽玄胡

索也□曰今茅山上龍洞仁和菴橋亦種之寒露前

栽種之立春後生苗高三四寸延蔓布地葉必三之

宛如竹葉片片成個細小嫩綠邊色微紅作花黃色

亦有紫花者根叢生蔓延狀似半夏但黃色耳立夏

掘起陰乾者良

清劉雲密本草述

延胡索出壇溪陵澗者佳

鎮江府志

延胡索生田中雖平原亦種

東陽縣志

延胡索治腹

中結塊心氣腰痛等疾 府志云出金壇溪菱澗者

佳金壇縣志玄胡索李時珍先生曰生東北夷方今二茅

山上龍洞及仁和笕橋亦種之寒露後栽種立春後

生苗高三四寸延蔓布地葉必三之宛如竹葉片片

成个細小嫩綠邊色微紅作花黃色亦有紫色者根

叢生蔓延結如芋粒亦如半夏但色黃耳立夏後掘

取洗淨酒浸蒸晒乾得蟲蛀未尤良活血化氣第一

明倪朱謨本草景言

增補廢物類纂

玄胡索試効療心胸小腹遍體諸痛撰修凡撰玄胡

索以狀似半夏色黃者爲佳華舫所載來惟是一品  
此邦未產此物用時水洗剉細凡醋炒鹽炒及上部  
酒炒中部醋炒下部鹽水炒等劑皆不取又唐李珣  
曰蟲蛙成未者尤良甚非也蝕餘何能治病可謂迷  
矣近時官園有一種玄胡索葉似魚子牡丹而厚花  
紫色世間未曾見之與本草云葉如竹葉樣者大異  
也不知李時珍所未見者而別是一種乎聊記以存

疑焉

一本堂  
藥撰

延胡索 一名玄胡索漢曰リ來ル無和亦無偽雜

滴金卵

延胡索  
用藥須知

延胡索

唐ヨリ來ルヲ用ユ

別本ニナコヲト

云

又カンセキラニ充ル誤也又和ニナシ

本草

會誌

照任曰奥州三春ニ延胡索ヲ出ス其根或ハ白ク

或ハ黄ナリ則獻上ス 先生按スルニ是真ノ延

胡索ナルヤ本草ニ葉ノ形チ根ノ形チノミシル

シテ詳ナラズ今江都ニテ延胡索トイヘル草ヲ

ミルニ葉ハ華蔓草ニ少シ似テ花モケマンニ似



テ紫色三月花サク是モ亦イブカシ本草ニハ竹

ノ葉ノ如シトアリ抹藥使記

延胡索 和産所在ニアルモノ花葉頗相似タリ

トイヘバ根色白甚小ニノ不堪用○漢種上品享

保中種ヲ傳フ大葉小葉ノ二種アリ俗牡丹葉延

胡索ト云葉形三叉ニノ微ク牡丹葉ニ似タリ二

月紫花ヲ開地錦苗花ニ似タリ根ノ形半夏ニ類

ノ黄色ナリ物類品隣

延胡索 ツブテ 江州 ゲモ 南部

一名滴金卵

藥譜輯  
耕錄

元胡索  
品字  
箋

玄壺索一  
玄胡  
萬病  
回春

延胡  
同上

武胡索  
外科  
大成

享保中漢種渡ル大葉小

葉ノ二品アリ大葉ヲ牡丹葉ト云一葉三枝枝ヅ

ト二三葉葉ノ末五ニ分レ至テ小ナレモ牡丹葉

ノ狀アリ十二月或ハ初春苗ヲ生ズ大葉ハ苗高

サ五寸許小葉ハ短小ナリ葉ハ皆和産ヨリ厚シ

正二月花ヲ開ク形紫莖花ニ似タリ初ハ紫色後

ハ漸ク青色ヲ帶花後小扁莢ヲ結ビ四月ニ苗枯

和産ニ大葉中葉小葉ノ三種アリ大葉ハ濃州ニ

アリ葉ハ荷<sup>ケ</sup>包<sup>ミン</sup>牡丹<sup>サウ</sup>葉ニ似テ小ナリ中葉ハ紀州  
勢州田野道傍ニ多シ勢州則見ニテ此花ヲ次郎  
坊ト云紫花地丁花ヲ太郎坊ト云小兒ノ戯ニ兩  
草ノ花萼ヲ互ニ勾引ノ勝負ヲ決ス花ハ漢種ト  
同ジ三月開ク小葉ハ山ノ幽谷ニアリ葉至テ小  
シ苗高サ僅ニ二三寸莖細クメ絲ノ如シ花ハ漢  
種ヨリ微シ小シ深山ニテハ四月ニモ花アリ地  
冷ナル故ナリ和産ハ根大ナルモアレ氏多クハ  
色白ク半夏ノ如シ熊野ニ産スルハ微シ黄色ヲ

帶藥肆ニテ售漢渡ノモノ上品ナリ根圓ク或ハ

正圓ナラズ外皮黃褐色内ハ色黃ナリ唐山ニテ

小キ半夏ヲ煮テ色ヲツケ偽ルヲ錦囊秘録ニ見

エタリ  
本草綱目啓蒙

延胡索 ジラウボウ 勢州及ビ尾州濃州ニ産

ス毎歲寒露ノ後栽ユ立春苗ヲ發ス葉魚子牡丹ケミシサウ

ニ似テ小二月莖ヲ起シ花ヲ開ク色淡紫地錦苗

ニ類シテ美ク根半夏ノ如クニシテ色黃一種小

葉ノ者アリ貴布襦鞍馬山中所在ニアリ宿根ヨ

リ生ズ  
景花

玄胡索 延胡索 セムウ 唐藥 ○滴金卵 エン

ゴサクナリ ○延胡索 玄胡索 セムウ 唐藥 品

草手引

延胡索 番名 レツトルスホラル 紅毛 漢渡用ベ

シ或人云和俗ニジラウバウト呼ト典云和ハ迄

江伊吹ノ者佳ナリ山城貴船鞍馬山中ニ生ズ葉

ハ野ゲマンニ似タリ二月深紫花ヲ開ク根露出

ス漢産半夏ニ似ズ今 官園ノ漢種大葉小葉ノ



二種アリ延胡索先輩ガンゼキラシ或ハ黃蕙ニ充

ツ並ニ誤ル千金方  
藥註

延胡索 用藥須知漢ヨリ來ル和ナシト云近年

伊吹山中ニ多ク有之形狀本草ニ相合フ真ナリ

然性味未試本草  
正譌

延胡索 和名 ツブテ江州 ゲモ南部 ジラウホ

ウ蘭山 ト蝦夷土人根ヲト 數種アリ唐種  
花彙 ト煮テ食フト云

上品ナリ享保年中漢種渡リ牡丹葉竹葉ノ二種

アリ正二月宿根ヨリ生ス葉ハ牡丹葉ニ似テ小

ニシテ粉綠色軟ナリ兩三極ヲ生シ穗ヲナシテ  
花ヲ開ク形黃芩ニ似テ淡紫色又陶朱術トケケミンニ似タ  
リ後扁ヒ莢ヲ結ブ長サ一寸許根ハ圓ノ黃色指  
頭ノ大サナリ一種ハ葉狹長ニシテ荷苞ケミンサウ牡丹ニ  
似テ小ナリ根稍小ナリ此二種上品藥用ニ入ベ  
シ延胡索ノ根兔好ンデ掘食フモノナリ一種肥  
後ノ熊本ニ三葉ノモノアリ葉ノ形胡子花ノ如  
クニシテ粉綠色中央ニ紫色ノ斑アリ根黃白色  
疣アリテ正圓ナラズ一種武州豐島郡道灌山ノ

産ハ葉ノ形竹葉ニ似テ甚小三枝十四五葉ヲナ  
ス根ハ白色ニノ半夏ノ如ク疣アリテ正圓ナラ  
ズ時珍説ニ似竹葉様ト云是ナリ下品ナリ蘭醫  
シイボクト云コレイダリステキユムベンス又  
尾州ヨリ來リ葉極テ細長ニノ胡荽ノ梢葉ニ似  
テ花大ク青碧色ニ美ナルモノアリ根白色ニシ  
テ小ナリシイボルト云コレイダリスシ子ウシ  
ス共ニ下品ナリ藥店ニテ零餘子或半夏等ヲ涂  
テ偽ルアリ擇ブベシ

本草  
穿要

延胡索 享保年中唐種渡ル上品ナリ正二月苗  
ヲ發ス葉ハ牡丹ニ似テ小ク粉綠色花ノ形黃芩  
ニ似テ淡紫色又桃朱術ヤブケニ似タリ根圓シ  
テ皮肉ミナ黃色指頭ノ大サニテ上品ナリ一  
種肥後ノ熊本ニ産スルハ三葉ニシテ中央ニ紫  
色ノ斑アリ花紫色根ハ唐種ノ物ニ似タリ一  
種葉ハ牡丹葉ニ似テ稍細ク花淡紫色ナルアリ  
是又漢種ナリトイフ 一種尾刈ヨリ來ル葉極  
テ細長ニシテ胡荽ノ梢葉ノ如ク花大ニシテ青

青色根白色下品ナリ時珍ノ説ニ似竹葉様トイ

フ是ナリ

一種

ツブテ

江州

武州道灌山ニ産ス

ルハ葉ノ形竹葉ニ似テ小ク三枝十四五葉ヲナ

ス花淡紫色根白色ニシテ半夏ノ如ク疣アリ下

品ナリ又武州井ノ頭ニアルハ長葉ニシテ紫斑

アリ共ニ下品ナリ

本草  
圖譜

ツブテ

延胡索江州  
本綱十三

○ゲモ

延胡索南部  
本綱十三

○ジラウ

パウ

延胡索花之  
本綱十三名

本草藥名備  
考和訓鈔

延胡索

一名武胡索

外科  
八成

玄壺索

百一  
選方

ツブ



テ 江州方言

ゲモ 南部

次郎坊 伊勢

野生アリ葉竹葉

ニ似テ小也至甚小シ花淡紫色又稀ニ白花モアリ至長ク余程大ナルモアリ濕地ニ生小豆澤ニアルモノハ竹葉ニノ花漢種ニ似テ根ノ至大ナレバ白シ江州伊吹山ノ産小豆澤ノモノニ似テ花碧色也漢種ヲ牡丹葉ト云都テ小草也葉牡丹ニ似テ甚小春花ヲ生紫色ニノヤブケマンノ花ニ似タリ根ノ至大ニノ黄也又官園ニ竹葉ト云アリ甚葉コマカニノ花少異ニノ根ノ至ハ相似

テ黄ナリ 工區別 百花生

延胡索 物理小識云葉似竹葉根似半夏茅山上

龍洞杭州笕橋種之○琉球土名玉富志草 琉球產物志

延胡索 漢渡常有形如半夏黃色而堅味辛苦者

良偽者將鬱金煎汁煮薯蕷子云出於大和者略似

漢渡出於近江美濃者雖根大色不黃其葉似牡丹

葉而小又有似竹葉者近見蝦夷種草本稍大而二

種俱有然其根白而味淡土名計吳毛一名刀麻草

綱目  
纂疏

延胡索 牡丹葉下總佐倉近山ニ多アリ極テ陰

地ノ土手ニアリ葉少シク牡丹ニ似タリ花モ少

シ紅色美ナリ根モ大ナリ故ニコ、ニ圖ス 上

總鹿野山ノ近邊白鳥明神山ニアリ葉常ノ延胡

索ヨリ大ナリ根モ圖ノ如シ

總州草  
本考

エンゴサク 通名 ビツチリ

濃州  
神淵

延胡索 滴金卵

藥物品  
譜識名

延胡索 一玄  
胡索 舶來多シ上品ナリ 和産ノモノハ

形小ク輕虚ニシテ黄色淺ク或白色ヲ帶ブ下品

ナリ藥舗ニ真ノ延胡索ト云漢種ヲ栽シモノアリ市中ニ未出用

考藥品

延胡索

武胡索  
玄胡索

光胡索

漢種アリ和産アレ

氏不出

唐種

享保年中漢種渡ル大葉小葉ノ

二品アリ根小ニノ黒色ヲ帶ルアリ土地ニヨル

ベシ又漢種ヲ栽テ年久キモノハ根大ニシテ黄

色ナルモノアリ

手板  
蒙

老鴉草

倭種延胡索  
ジラウバウ

生陰地九十月生苗葉極柔

潤莖亦不硬高六七寸春開花俗名老鴉草

癸卯潘  
貞蔚石

家質問  
辰本草

本草通串卷五十一







本草通串 冊六一五十一

日本古典全集之内

編纂者

正

宗

敦

夫

東京市豊島區長崎東町三丁目一六一

發行者

合資

會社 日本古典全集刊行會

代表社員

長

嶋

東

一

東京市豊島區長崎東町三丁目一五八

印刷者

不二印刷所

高瀬

清吉

東京市豊島區長崎東町三丁目一六一

發行所

合資

會社 日本古典全集刊行會

振替東京七三〇三二

昭和十四年三月廿三日印刷  
昭和十四年三月廿八日發行

【非賣品】












UNIVERSITY OF TORONTO  
LIBRARY

WILLIAM H. DONNER  
COLLECTION

*purchased from  
a gift by*

THE DONNER CANADIAN  
FOUNDATION

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO



3 1761 03056 4553

RS  
180  
J3S8  
1937  
v.12

